

Проф. П. ШТРАССМАН

\*

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ  
И  
ДИЭТИЧЕСКИЕ  
НАЗНАЧЕНИЯ  
В  
АКУШЕРСКО-  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКЕ

\*

1 • 9 • 2 • 7

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
НАРКОМЗДРАВА РСФСР  
МОСКВА

Проф. д-р П. ШТРАССМАН

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ  
И  
ДИЕТИЧЕСКИЕ  
НАЗНАЧЕНИЯ  
В  
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПРАКТИКЕ

ПЕР. С 4-го НЕМЕЦКОГО ИЗДАНИЯ  
д-ра М. М. РОЙХЕЛЬ

116.9085



ИЗДАТЕЛЬСТВО НАРКОМЗДРАВА РСФСР  
МОСКВА 1 9 2 7

Типография и Словолитня  
„КРАСНАЯ ПРЕСНЯ“  
Малая Грузинская,  
Столярный п.,  
№ 5-7.

Главлит № 84716

Тираж 2.000

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

|   | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| Общие сведения . . . . .                        | 9           |
| Акушерство . . . . .                            | 11          |
| Заготовление необходимого стр. 11. Роды стр. 13 |             |
| Памятка для беременных стр. 14.— Образ жизни    |             |
| стр. 15.—Приготовление к кормлению грудью,      |             |
| слинотечение. Разрыв промежности стр. 17.—      |             |
| Выкидыши стр. 18.—Послеродовые схватки,         |             |
| послед стр. 19.—Послеродовой период стр. 20.—   |             |
| Новорожденный стр. 21.—Уход за грудью           |             |
| стр. 23.—Воспалительные процессы груди,         |             |
| отнятие от груди стр. 24.                       |             |
| Боли в крестце . . . . .                        | 26          |
| Ванны и водолечение . . . . .                   | 27          |
| Вены . . . . .                                  | 32          |
| Расширение, воспаление вен стр. 32.             |             |
| Впрыскивание в вены стр. 33.                    |             |
| Возбуждающие средства . . . . .                 | 35          |
| Припадок астмы стр. 36.                         |             |
| Воспаление легких (после операций) . . . . .    | 37          |
| Втирания . . . . .                              | 38          |
| Выпадение волос (уход за кожей) . . . . .       | 39          |
| Фурункулез стр. 40.                             |             |
| Головные боли . . . . .                         | 41          |
| Дезинфекция . . . . .                           | 42          |
| Зуд (Pruritus) . . . . .                        | 45          |

|   | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| Иниас . . . . .   | 47          |
| Кишечник и желудок . . . . .  | 48          |
| Слабительные средства стр. 48.—Кишечные паразиты стр. 50.—Вздутие стр. 51.—Поносы (Diarrhoea) стр. 52.—Рвота у беременных стр. 53.—Рвота после варкоза стр. 53.—Аппетит, желудочные средства стр. 55.—Прямая кишка стр. 56.—Запоры стр. 58.—Уход за ртом стр. 59. |             |
| Климактерический возраст . . . . .  | 60          |
| Кровотечения . . . . .  | 61          |
| Впрыскивания стр. 63.—Переливание крови стр. 64.—Бледная немочь, малокровие стр. 65.  |             |
| Курорты . . . . .   | 67          |
| Морские купанья стр. 67.—Горные станции стр. 67.—Степные кумысолечебные стр. 67.—Бальнеотерапевтические стр. 68.—Грязевые стр. 68.  |             |
| Лечение ран . . . . .   | 69          |
| Материал для швов . . . . .   | 71          |
| Менструации . . . . .   | 73          |
| Болезненные менструации (Dysmenorrhoea) стр. 73.—Отсутствующие менструации (Amenorrhoea) стр. 74.   |             |
| Молоко . . . . .  | 75          |
| Мочевой пузырь (мочевые пути) . . . . .   | 76          |
| Слабость мочевого пузыря, цистоскопия стр. 78.—Воспаление почечных лоханок стр. 79.—Почки стр. 80.  |             |
| Наркоз (приготовление к операции) . . . . .   | 81          |
| Борьба с боязнью стр. 81.—Наркоз, анестезия стр. 82.—Лумбальная анестезия стр. 83.—Сакральная, местная анестезия стр. 83.—Исследование под наркозом стр. 85.—Наркоз и выскабливание стр. 86.  |             |

|   | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| Первность . . . . .   | 88          |
| Обезболивающие средства . . . . .   | 89          |
| Одежда . . . . .  | 91          |
| Ожирение (лечение) . . . . .  | 92          |
| Пессарии . . . . .  | 94          |
| Питание, усиленное . . . . .  | 96          |
| Повышенная температура (лихорадка) . . . . .  | 97          |
| Повышенная температура с воспалением ад-<br>нексы стр. 99.  |             |
| Половая сфера . . . . .   | 100         |
| Половые сношения (вагинизм), псовая чув-<br>ствительность стр. 100.—Бесплодие (продува-<br>ние труб) стр. 101.—Тришнер стр. 102.—Пахо-<br>вые железы, мягкий шанкр стр. 104.—Сифи-<br>лис стр. 105. |             |
| Потение . . . . .   | 109         |
| Простуда. Насморк . . . . .   | 110         |
| Радий. Мезоторий . . . . .  | 111         |
| Рентгенотерапия . . . . .   | 113         |
| Сердце . . . . .  | 116         |
| Смазывания . . . . .  | 117         |
| Снотворные средства . . . . .   | 118         |
| Сиринцевания . . . . .  | 120         |
| Кобчиковая кость . . . . .  | 123         |
| Тампонирование . . . . .  | 124         |
| Укрепляющие средства . . . . .  | 125         |
| Холодные ноги . . . . .   | 126         |
| Чай . . . . .   | 127         |
| Эмболии легких . . . . .  | 128         |
| Некоторые диететические указания . . . . .  | 129         |
| Высшие дозы ядовитых и сильно-действующих<br>лекарственных препаратов для взрослых (и<br>детей) . . . . .   | 132         |
| Таблица беременности . . . . .  | 137         |
| Некоторые важнейшие средние данные . . . . .  | 138         |

|   | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| Физиологические данные детского возраста . . .  | 139         |
| Количество материнского молока, высасываемого<br>нормально развивающимся грудным ребенком .   | 140         |
| Химический состав молока (женского, коровьего,<br>козьего) . . . . .  | 140         |
| Калорийная ценность главнейших видов пищи<br>для ребенка в возрасте до одного года . . . .  | 140         |
| Прорезывание молочных зубов . . . . .   | 141         |
| Некоторые важнейшие законодательные акты . .  | 141         |
| Женщина-обвиняемая стр. 141. — Применение<br>к женщинам мер исправительно-трудового воз-<br>действия стр. 141.—Охрана труда женщин<br>стр. 142.—О производстве абортв стр. 143.—<br>О правах медицинских работников стр. 145. |             |

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ НЕМЕЦ- КОМУ ИЗДАНИЮ.

Уже несколько лет, как я раздаю во время лекций моим слушателям, студентам и врачам, в отпечатанном виде применяемые мною в клинике медикаментозно-диететические назначения. Так как этими назначениями интересовались и другие лица, я решил их опубликовать.

Не следует искать в этой небольшой книге большего, чем указано в ее наименовании: здесь приводятся испробованные в моей клинике и оказавшиеся полезными лишь медикаментозные и диететические назначения, но не оперативные мероприятия. Указания имен и литературы выпущены. На полноту эти страницы претензий не пред'являют. Но, может быть, они напомнят практикующему врачу о том или другом необходимом ему в практике.



## Общие сведения

## Общие сведения

1. По возможности не давать пациентам на руки ядовитых веществ!
2. Не назначать ничего плохо пахнущего, оставляющего на белье пятна и портящего его!
3. Назначать дешевые лекарства. Избегать патентованных средств. Беречь деньги больных и народные!
4. Применять таблетки и ампулы!
5. При назначении сильно-действующих средств и назначениях для девочек моложе 15 лет справляться всякий раз с прилагаемой в конце книги таблицей!
6. Точно указывать в рецептах способ применения прописываемого лекарства. (Обозначения „как сказано“, „как предписано“—бесполезны!). Оставлять у себя копии рецептов!
7. При плохом аппетите назначать лекарства по возможности в форме пилюль! Неприятное на вкус—нецелесообразно!
8. Инъекции эрготина и секакорпина делаются в ягодичу; все же остальные—в наружную часть бедра.—С а в е: внутривенных и внутримышечных инъекций!  
Вливания физиологического раствора поваренной соли (6,0 NaCl, 1000,0 Aq. destill. темп. 42°Ц.) делаются под ключицу, а не в грудь!  
Иглы для шприца кипятить в пробирке!
9. Термометр!

Прохладно = 20°Ц.,

Тепло = 40°Ц.,

Тепловато = 30°Ц.,

Горячо = 50°Ц.

**Общие  
сведения**

10. Лечебные манипуляции в гинекологическом кресле производить не чаще 2 раз в неделю! Лечение случаев малой гинекологии не должно продолжаться более 6—8 недель!
11. Исследовать мочу каждой больной на белок и сахар! Записывать каждую последнюю менструацию!
12. Ни одно хирургическое вмешательство у особ, моложе 16 лет, не должно производиться без письменного согласия родителей или опекунов.

Primum non nocere!

Терапия бесконечна. Всегда еще можно что-либо найти, чтобы облегчить положение больного.

## АКУШЕРСТВО.

Акушерство

### Принадлежности.

Принадлежности

1. Необходимые принадлежности для матери и ребенка.

1—2 кгр стерильной ваты.—Лигнина (значительно дешевле ваты).

2 подкладных клеенки по 1,5 м [клеенку можно заменить газетной бумагой, сложенной в 6 раз (и стерилизованной проглаживанием горячим утюгом)].

Тюфики из древесной мочалы (Саве: сулемы!) 80 см. × 80 см. (роды).

2 тюфика из древесной шерсти 45 см × 60 см. (неделя после родов).

1 баночка со стерильными марлевыми салфеточками.  
6 бинтов.

1 бинт специально для тампонады матки.

2 щетки для рук, почаще кипятить!

Пара резиновых перчаток № 3.

Ирригатор со стеклянным наконечником (1 красная и 1 черная резиновые трубки).

Таз с ручкой.

Максимальный термометр.

Термометр для воды.

Поильник.

(Акушер-ство) 500 гр Lysoform'a, или же вместо него: Ligu. For-  
maldehyd. sapon.

Принадлеж-ности 200 гр мыльного спирта, 200 гр древесного спирта,  
100 гр мыльно-карболового раствора (для аку-  
шерки).

1 банка зеленого мыла. Борная кислота в порошке в  
в банке для припудривания.

1 кусок детского мыла, детская пудра, детские весы.

Врач должен быть предупрежден до наступления  
схваток.

## II. Медикаменты

(запасться в начале родов):

1. 50 гр хлороформа.
2. Маленькую бутылочку секакорнина.
3. Sol. Argent. protein. 10,0 (глазные капли).
4. Rp. Chloral. hydrat. 4,0.  
Morphin. hydrochloric. 0,04.  
Sirup. simplex ad 60,0  
M. D. S. Принимать по столовой ложке на молоке  
(через 1—2—3 часа) для успокоения при сильных  
схватках, ночью, а также при слабых схватках.
5. Слишком возбужденным делается вырыскивание  
1 шприца морфия.
6. Rp. Ligu. Ammon. anis.  
Tinct. Valer. aeth. aa 10,0.  
M. D. S. По 20 капель (при упадке сил).

## Роды.

(Акушерство)

Роды

Морфий-скополамин-паркоз (в больницах не применяется), исключительно при нормальных родах. Не раньше, чем матка раскроется до размера серебряного рубля!

С а в е: при преждевременном разрыве плодного пузыря—при узком тазе—преждевременных родах, у пожилых женщин, рожающих в первый раз, при ненормальном положении плода!

Rp. Morphin. hydrochlor. 0,1

Scopolamin. hydrobrom. 0,0015

Aquae destill. 10,0 M. D. S. На руки врачу  
(2 шприца не ранее чем через час после родов)  
позже только

Rp. Scopolamin. hydrobrom. 0,0015

Aquae destill. ad 10,0 M. D. S. На руки врачу.

(В случае необходимости вырскивать по 1 гр.;  
наблюдать за сознанием).

Приготовить все необходимое на случай асфиксии или Оligорное ребенка.

Препараты гипофиза:

Применять только там, где роды могут пройти легко и без осложнений! Следить за сердцем.

С а в е: несоответствий между величиной плода и размером таза!

Пожилых, рожающих первый раз!

При атонии после родов!

В ампулах: Pituitrin по 0,3—0,7. Вырскивать в промежутках, не короче 24 часов!

(Акушерство)

## Памятка для беременных.

Памятка  
для беременных

Беременность есть естественное состояние, а не болезнь. Она служит доказательством того, что органы женщины здоровы.

Развитие плода вызывает изменения тела. Грудные соски и кожа на животе зачастую окрашиваются в коричневатый цвет, медленно исчезающий после родов.

Беременная должна ухаживать за своим телом и содержать его в чистоте. Наружные половые органы должны ежедневно обмываться. Спринцевания делаются только по назначению врача.

Беременная может беспрепятственно заниматься домашними работами до наступления родов. Следует избегать слишком больших напряжений, поднятия тяжестей, долгого пребывания на ногах, особенно в последние месяцы беременности.

Питание должно быть обычным. Есть больше, чем всегда, или, как принято говорить, „за двух“, не следует: это вызывает слишком тяжелые роды, благодаря большому плоду. Употребление алкоголя (пиво, вино, водка) запрещается. Также не следует пить в течение дня больше  $\frac{3}{4}$  литра молока. Необходимо заботиться о ежедневном стуле; этого можно достигнуть употреблением обильного количества фруктов и т. д., если необходимо—слабительными. Есть мясо в умеренном количестве!

Платье не должно стягивать живота. Рекомендуется носить хорошо сидящий бюст на животе (особенно при висячем животе) и бюстгалтер. Круглые резинки ведут к расширению вен на ногах. Поэтому носить подвязки, прикрепленные к поясу! Слишком высокие каблуки вредны.

Половые сношения в последнем месяце беременности должны быть совершенно прекращены. При

наступлении схваток половое сношение для беременной грозит опасностью ее жизни. (Акушерство)

Грудь должны быть закалены ежедневным обмыванием мягкой тряпочкой и холодной водой. Щетки, алкоголь, коньяк и т. д. запрещаются. Образующиеся на сосках от молозива корочки не следует срывать, а необходимо удалять осторожно, смазывая их маслом или вазелином. **Памятка для беременных**

При наличии каких-либо болезненных явлений, кровотечений, выделений из влагалища, опухоли ног и внешних половых органов, головных болях, бессоннице, изменениях в нервной системе, кожной сыпи, беременная должна немедленно обратиться за советом к врачу.

Беременная немедленно после появления болей в крестце, схваток в животе, отхода вод или слизи должна лечь в родильный приют.

По всем правовым и другим, касающимся беременности, вопросам должно обращаться в соответствующий отдел охраны материнства и младенчества.

См. также Ожирение, Рвота, Преждевременные роды, Расширение вен.

### **Образ жизни.**

### **Образ жизни**

Бережись (в течение первых 4 месяцев беременности) в те дни, когда до беременности обычно наступали менструации.

Поездки, вызванные действительной необходимостью, разрешаются! Дать на дорогу опиные свечи (0,05)!  
Переезжать с одного места на другое—запретить

Поездки запрещаются после выкидыша или при наличии альбуминурии!

(Акушер-ство) Купаться два раза в неделю (ванна темп. 34° Ц.: в течение 10—15 минут).

Ежедневный стул!

Образ жизни

Физическую работу не прекращать до родов! Бинт на живот! Вюстгалтер!

Лечение от ожирения: (см. стр. 92) в последние 4 месяца у пожилых, рожаящих в первый раз, большим плоде и узком тазе!

При склонности к кровотечениям давать желатин (см. стр. 64) за 10—12 недель до начала родов.

При слабом организме или рождении очень слабых детей:

*Plv. antirhachiticus:*

*Rp. Calc. carbon. praecip. 16,0.*

*Calc. phosphor. 7,5.*

*Ferr. lactic. 1,5.*

*Sacch. lactic. ad 50,0 f. plv.*

*M. D. S.* Роженицам принимать. 2—3 раза в день на кончике ножа на молоке, или новорожденным на кончике ножа на  $\frac{1}{2}$  литра воды.

При катаре влагалища спринцевание

*Rp. Sol. acid. lactic. (50,0) 300,0.*

*D. S.* 1 столовая ложка на  $\frac{1}{2}$ —1 литра, или

*Zinc. sulf.—(100,0)* 1 чайная ложка на 1 литр кипяченой воды.

*C a v e:* Antiseptica!

*Rp. Sol. Hg. oxycyan. (5,0) 300,0.*

*D. sub sign. venen.*

*S.* 1 столовая ложка на 1 литр кипяченой воды для полосканий (*Colpit. granulosa*).



Приготовление к кормлению грудью. Слюнотечение. (Акушерство)  
Разрыв промежности.

Приготовление к кормлению грудью. Приготовление к кормлению грудью  
Обмывание грудей холодной водой!

С а в е: обмывания сосков спиртом или коньяком! Слюнотечение  
С а в е: щеток!

Слюнотечение.

Rp. Homatropin. hydrobrom. 0,005.

Plv., Succ. Liquir. aa 1,0.

Mass. pil. q. s. ut f. pil. № L

D. S. 2—3 раза в день по 1 пилюле.

Разрыв промежности.

1. Задний проход не поврежден:

С а в е: влагалищного шва!

Сшивать или захватить зажимами только кожу—  
зажимы Негг'а кипятить в пробирках.

Задний проход поврежден: Кишечно-шел-  
ковый шов! Узел за прямой кишкой—шов от вла-  
галища—тело промежности—кожа.

В течение 7 дней жидкая пища.

На восьмой день стул.

С а в е: Antiseptica!

С а в е: вторичного шва!

Пластичка спустя лишь  $\frac{3}{4}$  года!

Болезненные гранулирующие раны:

Марлевые салфеточки с цинковой мазью, или

Anaesthesin 5,0

Ungt. neutrale ad 50,0.



(Акушер-  
ство)

Опийная мазь:

Rp: Op. pur. 2,5.

Resorbin ad 50,0. M. f. ungt. D. S. Наружное.

## Выкидыш

## Выкидыш.

Выкидыш:

1. Угрожающий: покой, в течение 8 дней после кровотечения—Ежедневно опийные свечи (0,05—0,1).  
С а в е: пузырь со льдом!

2. Начинаящийся: тампонада влагалища.—Тампонада матки (иодоформо-глицериновую марлю прокипятить в колбочке—закрывать резиновым колпачком—сохранить).

3. Начавшийся: опоражживание. С а в е: корпачгов или подобных инструментов.

4. Закончившийся: препараты спорыньи — лежать одну неделю.

5. Неоконченный: опоражживание, выскабливание (никогда не делать без ассистента).—Ляминарии всегда опасны, так как могут задержаться, лучше всего тампон из иодоформо глицериновой марли, который можно оставить лежать в течение нескольких дней! Опоражживание во время кровотечений или поднимающейся температуры!

При выкидыше или преждевременные роды: состояние здоровья супруга! Реакция Вассермана! Втирание супругу ртутной мази.

1. При люэсе: см. отдел Сифилис.

У супруги: массаж с красной мазью (Ungt. Hydrarg.

сум. Resorcin. parat. rubrum). Во время беременности ежедневно по 1 гр Sajodin или

(Акуше р-ство)

Rp. Kal. jodat. 12,0.

Syr. aurant. 20,0.

Aq. destill. ad 200,0

Выкидыш

D. S. Ежедневно по 1 столовой ложке.

По прошествии 12 дней 1—2 недель. пауза и т. д. продолжать до 8 месяцев (не принимать при головных болях, насморке, иодной сыни, расстройстве желудка); или неосальварсан впрыскивание сулемы (1 раз в неделю), см. ниже; по прошествии 6 недель курс иодного лечения.

2. При отсутствии люэса: избегать в течение года беременности! Лечение минеральными ваннами. —Спринцевание Дуголевским раствором!—Впрыскивание экстракта лютеина (0,7—1,0) 1 раз в неделю. См. также беременность.

Выскабливание при катаре лишь при наличии сильных менструаций!

Во время беременности: Саве: Алкоголя, напряжений, ванн, половых сношений.

В те дни, когда обыкновенно бывали менструации (в течение первых 4 месяцев), лежать. Пессарий вставлять до 3 месяца. Под-калий (как опыт).

### Послеродовые схватки.

Послеродовые схватки

Послеродовые боли на первый и второй день: Приснищкие обертывания.

Аспирин в таблетках. Антипириин 0,5.

Впрыскивания морфия 0,01.

**(Акушерство)** Послед: С а в е: слишком рано выдавливать!  
Выждать, все время контролируя! Выдавить не ранее, как через полчаса.— Катетер! При потере 1000 куб. см. крови выжимать под наркозом, вообще же отделять рукой!—Ощупывать также и при сомнительном положении!

Через 2—3 часа Креде под наркозом, при неудаче—отделение рукой!

С а в е: последующих спринцеваний.

Лучше войти лишний раз в матку без необходимости, чем что-нибудь в шей оставить!

**Послеродовой период**

#### Послеродовой период.

Н а р у ж н ы е ополаскивания мыльной водой,—слабый раствор лизоформа ( $1/2^0_0$ ),—кипячая вода с самым незначительным количеством марганцево-кислого калия (чуть-чуть окрашено!).

1-й день: лежать на спине, двигать ногами.

2-й день: обернуть живот, лежать на боках.

3-й и 4-й день: первое опорожнение желудка (при шве промежности без клизмы!). Принимать активно сидячее положение в кровати после сложных родов—не ранее, чем на 10-й день.

Диета:

1-й день: жидкая пища, в особенности после наркоза,—сухари.

2-й и 3-й день: легкая пища (см. дальше) до первого опорожнения желудка.

В родильном приюте заставить встать с кровати за два дня до выписки!

Перед выпиской исследовать!

## Новорожденный.

(Акушерство)

Никогда не оставлять одного.

Кормить 6—7 раз, если он при пятом кормлении плохо ест и много кричит.

Купать с вечера, если ночью кричит слишком много.

Ночью сменить пеленки 1 раз.

У нездорового измерять температуру в прямой кишке.

При пролежнях и для предупреждения их—детская присыпка.

С а в е: свивать вместе с подкладной клеенкой.

П и т а н и е: при искусственном—постоянное прибавление овсяного отвара. Первое кормление: а) прокипятить 10 гр овсяной муки (десертная ложка) в течение 15 минут в 200 гр воды и процедить через прокипяченное сито; б) 200 гр молока кипятить в течение 2 минут; в) слить вместе „а“ и „б“ и добавить 1 большую столовую ложку (20 гр) сахару.

Г л а з а промываются кипяченой водой, немедленно после рождения головы, не ожидая появления плеч.—Обмыть ручки!—Капнуть по одной капле Solut. Argent. protein. (0,2) 10,0 во внутренние углы глаза при закрытом глазе.—Убрать всю стеклянную посуду и т. д.—Приподнять веко.—По окончании обсушить.

П у п о к: прокипятить тесемочку и перевязать пуповину на расстоянии 6 см—Обложить тампонами Принудрить борной кислотой.

Н е д о с т а т о ч н о е п р и с ы х а н и е:

Alaun (subtiliss. plv.) 10,0, или

(Акушер-ство) Bismut. subgallic. (sterilis.) 10,0 для припудривания.

Новорожденный При грануляции: палочка ляниса.

Пунок бинтуется в течение трех месяцев.

Melaena:

С а в е: ванны.

1 капля раствора адреналина в ложке холодного молока.

Клизма с 10 гр. желатина.

В течение 24 часов питать через задний проход: каждые 2 часа по 10 гр охлажденного материнского молока!

С о н j u n c t i v i t i s :

С а в е: Argentum catarrh!

а) Исследование на гонококки—отрицательное:

Каждый раз перед кормлением промывать глаза борным раствором.

б) Исследование на гонококки—положительное:

Промывать точно так же.—По утрам вкапывать

1 каплю Sol. Arg. nitr. (0,1) 10,0, после этого

Plumb. acet. neutr. 0,15, Vaseline 15,0 S. глазная мазь.

Г о р ч и ч н и к и при бронхите новорожденных, а также при коллапсе.

Горчица в порошке:

Смешать 2—3 ложки горчицы с горячей водой в кашлицу—намазать на сложенную вдвое полотняную тряпочку, приложить горчицной стороной к

груди, сверху обернуть шерстяным платком и носить ребенка в вертикальном положении. (Акушерство)

Посмотреть через 2—3 минуты, нет ли покраснев.

Снять. (Осторожно, не простудить).

Смазать борным вазелином.

Надеть полотняную рубашку.

Новорожденный

### Уход за грудью.

Уход за грудью

Врач, сестра, мать! Никогда не дотрагивайтесь до соска!

У перворожающих отсасыватель молока после употребления обмывается, каждый раз кипятится и сохраняется в сухом виде!

Перед накладыванием обмыть остуженной кипяченой водой, после этого обсушить и смазать при помощи тряпочки 10%-ной перугеновой мазью (см. ниже).

Трещины: тряпочка с перугеновой мазью:

Rp. Perugen. (или Bals. Peruv.)

Olei olivari aa 5,0

Lanolini ad 50,0 S. Грудная мазь.

Смачивать (по утрам) 2%-ным карболовым раствором.

1 капля анестезирует.

Rp. Bals. Peruvian. 1,5

Gumm. arab. 3,0

Ol. amygd. dulc. или Ol. arachid. 10,0

Aq. rosar. ad 40,0. M. f. emuls.

D. S. Для смазывания сосков.

К этому 1 кисточка.

Образованию молока содействуют: густые супы, —укропный чай, —пиво (по вечерам), —солодовое

(Акушер-  
ство)

пиво,—каштаны,—миндаль в сахаре,—картофель,—  
молочный сахар. Во время кормления ребенка  
пить попеременно молоко, шоколад, чай, солодовое  
пиво или есть суп.

Воспали-  
тельные про-  
цессы груди

При очень наполненных грудях их не-  
обходимо смазывать вазелином, подкладывать под  
них тонкий слой ваты и высоко подвязывать!

При воспалениях, повыш. температуре:  
С а в е: отсасывать, задерживать, массировать!

Немедленно прекратить кормление!

Компресс из разведенного глинозема или перекиси  
водорода, вощанка, вата! Высокая хирургическая  
повязка! Правая грудь по направлению к левому  
плечу, левая—по направлению к правому. Сверху  
пузырь со льдом!

По вечерам увлажнять повязку снаружи небольшим  
количеством раствора перекиси водорода!—Сменять  
повязку через 24—48 часов.—Начать кормить не  
ранее чем на 6 й—8-й день!

При операции больной груди (один раз основательно)  
необходимо сделать достаточное количество про-  
тив о л е ж а щ и х и н д и з и й! Резиновые трубки.  
Повязку оставить долго лежать.

С и м а я п о в я з к у, завязывать глаза.—Размягчать  
перекисью водорода.—Марлю не отрывать, а отма-  
чивать!—С а в е: кровотечения грануляций.

Снятие  
от груди

Отнятие от груди.

С а в е: июнь—август.



Постепенно добавляя:

Первая неделя—1 бутылочку,

Вторая „ —2 бутылочки,

Третья „ —3 „ и т. д.

(Акушер-  
ство)

—  
Отнятие от  
груди

Грудь смазывать вазелином и высоко подвязывать.

С а в е: отсасывать.

Горькая вода (Баталинская), Карлсбадская—пить понемногу!

Презжняя половая жизнь. (Coitus interruptus?—противозачаточные средства?).—Занятия, переутомление?

Исследовать мочу! Обратить внимание на воспаление почечных лоханок, туберкулез почек, почечные камни!

Не выпускать пациентку из под наблюдения! Исследовать позвоночник! Видимые абсцессы.— Исследовать нервную систему (табес—множественный склероз).

Обворачивание крестцом бинтом (повязка для рожениц).

Носить кошачий мех!

Массаж (3 раза в неделю по утрам в постели).

Emplastrum capsici, отмочить на шестой день!

Растирать (с вечера) хлороформным маслом, коньяком, Liniment. ammoniat. volat. (1 чайная ложка на фланель).

Вибрационный массаж.—Гимнастика!

Требования больного вытекают большей частью из правильного чувства. Пусть больной на собственном опыте убедится, насколько был прав врач!

## ВАННЫ И ВОДОЛЕЧЕНИЕ.

Ванны. Во-  
долечение

С а в е: Горячих ванн!

С а в е: Душей нервным!

С лечебной целью: купаться перед обедом в течение 15—20 минут, после чего выпить стакан молока и отдыхать в течение 1 часа в постели.

### Добавления к ваннам:

Добавления  
к ваннам

Ароматические: 1—2 стол. ложки *Mixt. oleoso-balsamica*.

Железистые ванны (для малокровных и гемофиликов).

Rp. Ferr. sulfur. 100,0

f. cum bolo globulus. D. tal. glob. № X

S. Растворить 1 глобулю в горячей воде.

Сосновый экстракт: 200,0; или канифероль (и т. п.) 2 стол. ложки на 1 ванну.

Ванна из отрубей (фурункулез, кожный зуд): 500,0 пшеничных отрубей в мешечке отвариваются в 5 литр. воды.

Углекислые ванны (таблетки покупаются готовыми); не теплее 33°C.

Поваренная соль, Штассфуртская соль или Тамбуканский маточный рассол 1000—3000—5000 гр

(С а в е: шероховатой, потрескавшейся кожи).

**Ванны. Во-** Сулема: на детскую ванну таблетка в 1,0, для  
**долечение)** взрослого—3,0—5,0.

Дубовая кора: 1 кг; берется 1 (—2) полных пригоршни на 2 литра воды, затем выкипятить до 1 литра и добавлять к сидячим ваннам, применяемым после пластических операций и т. п.

Наставления по водолечению для  
больных.

**Спринцева-**  
**ния**

### I. Спринцевания.

1. Спринцевания влагалища производится из кружки (ирригатора) с маточными наконечниками из стекла или из свинца. После употребления кружка, резиновая трубка и, в особенности, маточный наконечник должны быть хорошо промыты горячей водой и вытерты насухо. Маточные и грушевидные спринцовки опасны.

Каждая больная должна пользоваться только собственной кружкой.

2. Маточный наконечник вводится во влагалище на длину пальца. (У больных, носящих pessaries, маточный наконечник вводится под последний).

3. Во время спринцевания больная сидит над ведром; кружка стоит на столе или висит на стене таким образом, чтобы ее легко можно было достать рукой. Горячие же спринцевания лучше всего производить лежа на подкладном судне в постели.

4. В случае, если не дано никаких специальных указаний или спринцевания производятся лишь с гигиенической целью, например, больными, носящими pessaries, делаются прохладные или тепловатые спринцевания.

1) Прохладные спринцевания (вода из водопровода или комнатная). (Ванны. Водолечение)

2) Тепловатые спринцевания (25—30° Ц.).

5. Только по специальному назначению делаются: (Спринцевания.)

3) Теплые спринцевания (30—40° Ц.).

4) Горячие спринцевания (40—50° Ц.) — постепенно повышая температуру воды до „такой горячей, какую только можно терпеть“.

Добавлением служат: . . . . (в каждом отдельном случае по указанию врача).

6. Горячие спринцевания (1—2 литра), делаются 1—2 раза в день. После каждого спринцевания больная должна лежать хорошо прикрытой в постели в течение часа. Поэтому лучше всего спринцеваться утром перед вставанием и ночью перед сном.

Горячие спринцевания надо начинать с температуры минимум в 40° Ц.; спринцевания до 50° Ц. могут производиться из специального ирригатора. Не дольше 6 недель!

Горячие спринцевания необходимо прекратить:— во время менструаций, при появлении сильных болей или при задержке менструаций. Во всех этих случаях больная обязательно должна обратиться к врачу.

Добавлениями к горячим спринцеваниям служат:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| а) Стассфуртская соль 5 гр или              | } 2 стол. ложки<br>на 1 литр воды. |
| б) 2 литра Тамбуканского маточного раствора |                                    |

7. Добавления опускаются в наполненную водой кружку и хорошо размешиваются маточным накопчиком.

Если большой вставлен тампон (кусочек ваты, снабженный ниткой), она должна, при отсутствии специальных указаний врача, обязательно на следующий вечер удалить его, потянув за нитку. Пока лежит тампон, не должно делать никаких спринцеваний.

## Ванны. Во- долечение)

### Сидячие ванны

## II. Сидячие ванны (не более 4 недель!).

1. В сидячей ванне больная должна сидеть удобно; необходимо, чтобы вода покрывала весь живот, для чего понадобится минимум 2 ведра воды. Температура ванны должна быть равна  $35^{\circ}\text{C}$ ., а продолжительность ее 10–15 минут. Сидячая ванна принимается перед сном, три раза в неделю (а именно в понедельник, среду и пятницу).

2. Добавлением к ним служат или 400 гр. Стассфуртской соли или  $\frac{1}{2}$  литра Тамбуканского маточного рассола.

3. Верхняя часть тела укутывается плащом или одеялом. После ванны больная, обтеревшись, немедленно ложится в постель, предварительно нагретую бутылками с горячей водой.

4. Горячие спринцевания следует делать до сидячей ванны.

### Влажные компрессы

## III. Влажные компрессы (не более 2 недель!)

1. В чашке с 1 литром комнатной или тепловатой воды растворяют 2 ложки Стассфуртской соли или Тамбуканского маточного рассола.

2. Одно или два полотенца несколько раз складывают, вымачивают в чашке с раствором и затем хорошо выжимают.

3. Затем полотенцами обертывается или нижняя часть тела, или же они кладутся вокруг всего тела в длину, покрывая живот и бедра.

4. Мокрые полотенца покрываются водонепроницаемой тканью (клеенкой или вошанкой); сверху накладывается шерстяная материя с таким расчетом, чтобы края ее выступали за водонепроницаемую ткань. Вся повязка скрепляется английскими булавками.

5. Теплые влажные компрессы делаются обычно- (Ванны. Во-  
вечно вечером в постели и оставляются на всю ночь долечение)  
(3 раза в неделю, по вт., чт. и сб, т.-е. в те дни. —  
когда не делают сидячих ванн). Если компрессы Влажные  
делать днем, тогда их следует менять каждые компрессы  
4 часа.

6. По снятии компресса кожа обтирается одеколо-  
ном или холодной водой и затем вытирается насухо.

7. При шероховатой или прыщевой коже, вместо  
соли или маточного раствора, в воду добавляется  
глинозем (1 стол. ложка на 1 литр воды).

Продолжительность лечения:—спринце-  
ваниями 6 недель, сидячими ваннами—4 и компрес-  
сами—2. По воскресеньям, если нет специального  
назначения врача, не производится никаких видов  
водолечения.

Три назначения безвредны и почти всегда могут  
быть использованы: овсяный отвар, чай из ромашки и  
согревающий компресс! Не считай их маловажными!

## Вены

## ВЕНЫ.

### Расширение вен

### Расширение вен.

Приподнять конец кровати, подложив под ножки с обеих сторон по одному кирпичу. Сделать это уже во время беременности.

Полное запрещение алкоголя! Употреблять мало жидкости!

Голень с вечера обмывать теплой водой и припудривать! Утром обмывать ее прохладной водой.

Обворачивать эластическим бинтом.—Резиновые чулки (при расширении бедренных вен—очень высокие!) или же специальные бинты для расширенных вен.

На поверхностные вены — кусочки цинкового пластыря!

Бег и движение (швейная машина) разрешаются!—Лучше прогулки в горах, чем по морскому песку!

С а в с: продолжительного стояния и поднятия тяжестей!

### Воспаление вен

### Воспаление вен.

При болях, воспалениях или пробках—лежать. Высокое положение ноги. Тряпочки с глиноземом 2 ст ложки на  $\frac{1}{2}$  литр воды, клеенка или газета, шерстяной платок, Фолькмановская шина до исчезновения болей! Затем сухое обертывание.

Язвы голени:

Постоянная повязка из цинкового клея: высокое положение ноги в продолжение  $\frac{1}{4}$  часа.—



Чрезвычайно маленький кусочек иодоформенной марли на язву—окружность язвы смазать жиром.— Кэمبرиковый бинт, на который намазывается разжиженный подогреванием цинковый клей.— Бинт накручивать, но не туго стягивать (не менее 3 слоев марли с цинковым клеем один на другом)—поверх сухой бинт!—Пальцы и колено остаются свободными.— При застое, болях пациентка снимает повязку сама. В противном случае повязка остается лежать до 3 недель.

На половых органах: носить полотняный бинт так же, как во время менструаций!

### Впрыскивание в вены.

### Впрыскивание в вены

Внутривенное впрыскивание—вливание—прокол вены (также для сальварсана)—Вассерман: резиновый фартук для всех участвующих.— Шприц Рекорда с эксцентрической головкой для иглы.

Жидкость прокипятить—поставить в стерильной посуде в теплую воду.

Середину левого плеча перевязать туго полотенцем. Внутренний сгиб локтя протереть спиртом. Наполнить шприц, удалить воздух!

Вену наполнить и постукивать по ней! С а в е: поверхность вен!

Прокол. Наблюдать за выходом крови или высасывать ее. При Вассермане заставлять сжимать и разжимать кулак.

С а в е: паравенных впрыскиваний!

(Вены) Шприц вставить: развязать полотенце! Впрыскивать медленно, или медленно вливать.

**Впрыскивание в вены**

Вену изолировать, обвести двумя концами нитки, завязать узлы, не затягивая их, приподнять обе петли — вскрыть вену; ввести канюлю; верхнюю нитку обмотать; нижнюю затянуть крепким узлом. Сделать вливание свежее приготовленного раствора поваренной соли! (Свежее приготовленный раствор дистиллированной воды приобретать в ампулах.)

**Кровопускание:** инцизировать вену, если прокола недостаточно, отсосать 200—400 гр крови.

1—2 зажима или марля. Марля, мастизол, маленькие бинты. Руку держать согнутой. Зажимы снять через 2—3 дня.

## ВОЗБУЖДАЮЩИЕ СРЕДСТВА.

Возбуждающие средства

Тепло.—Горячие ткани.—Одеколон.—Баллон с кислородом (вдыхать в течение 5 мин., затем 10-минутная пауза). Дуговой свет (75°, начиная с 10 минут).

Rp. Coffein. natrio-benz. 2,0.

Aq. destill. ad 20,0.

M. D. S. 1—2 раза в день по 1 шприцу.

Digalen в таблетках (= Digitoxinum crystallis. 0,00025) внутрь или в ампулах (1—2 раза в день), см. Сердце.

Digipurat в таблетках или растворе.

Rp. Aether. sulf. 6,0.

Ol. camphor. (= 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>) ad 20,0

M. D. S. Несколько впрыскиваний в разные места или Ol. camphor. fort. (= 20<sup>0</sup>/<sub>0</sub>) так же.

Rp. Tinct. Strophanti 1,0.

Liq. Ammon. anis.

Tinct. Valerian. aeth.  $\overline{aa}$  ad 10,0

M. D. S. По 20 капель на сахаре.

Strophantin. Ампулы по 0,001! внутривенно (pro dosi et die!).—Внутрисердечная инъекция как ultima ratio.

Вливание: 1 литр физиол. раствора повар. соли (0,6<sup>0</sup>/<sub>0</sub>) с 10 каплями Supragenin'a (выписывать в оригинальной упаковке по 10 гр) (под кожу или внутривенно), 40° Ц.

Вливание в прямую кишку (укрепляющая капельная клизма).

$\frac{1}{2}$  литра овсяного отвара,  $\frac{1}{4}$  литра чая, 1 стакан красного вина, 2 куска сахару, 10—20 капель Tinct

(Возбуждающие средства)

Оpii—можно также с Coffein'ом или Digipurat'ом: все вместе 1 литр! 40° Ц. Вливать через капельную клизму! немедленно после операции (1—2 раза в день).

При наличии 150—200 гр материнского молока,—вливают таким же способом молоко.

---

Припадок астмы:

Впрыскивание Morph. hydrochlor. 0,01.

---

Папиросы, содержащие Stramonium.

---

Qui bene diagnoscit, bene medibitur.

Простуженных не оперировать.—Больных инфлуэнцей—не ранее, чем через 6 недель!

Меры предохранения:

1. Во время операции, а также при искусственных родах не снимать шерстяных чулок.

Шерстяная ночная рубаха.

2. Температура операционной комнаты 22° Ц.  
С а в е: водяного пара.

3. Сухие простыни.

4. При перевозке в операционный зал и обратно (и в подъемной машине) закрывать лицо.—Закрывать окна и двери.

5. Предварительно подогреть постель!

6. При первой возможности положить на бок! Гимнастика дыхания: каждые 1—2 часа глубоко вдыхать 6 раз при закрытом рте с поднятыми руками и глубоко выдыхать с прижатыми руками.

## Втирания

## ВТИРАНИЯ.

Общий массаж 3 раза в неделю по утрам (в постели).—  
Массировать с тальком или вазелином.

С а в е: массажа живота!

Коньяк 200 гр.—Камфорная мазь.

Муравьиный спирт для конечностей.

Linim. или Ol. Chloroformii (1 чайная ложка на фла-  
нелевую тряпочку) для „крестца“.

И о д - в а з о г е н (смазать на ночь и покрыть ватой).

Ментоловый бальзам.

Ревматические боли:

Мешок с горячим песком (наполнить тол-  
стый чулок песком, зашить его, надеть на него  
полотняный мешок, подогреть его на печке) (поль-  
зоваться им особенно во время обеденного отдыха).

Электрические грелки.

Натирать горчиным спиртом.

При подагре: вегетарианская пища. С а в е: алкоголя.

Таблетки атофана (1—3 гр).

Прежде всего, „больной человек“, а затем уже  
его болезнь.

Обращай внимание и на самые незначи-  
тельные жалобы. Например, усталость может  
быть ранним симптомом множественного склероза.

## ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС. УХОД ЗА КОЖЕЙ.

Выпадение  
волос. Уход  
за кожей

Выпадение волос: утром и вечером массировать самому себе кожу головы, один раз в неделю мыть голову мыльным спиртом или

Rp. Resorcin 15,0.

Spirit. odor. 75,0.

Spirit. dilut. ad 500,0

M. D. S. Для мытья головы (1—2 раза в неделю).

Rp. Bals peruv.

Extr. Chin.

Tinct. Canthar.

Succ. Citr. aa 2,0

Ol. amygd.

Ol. rosar. aeth. aa gtt. II. } вместо этого можно

Ol. geranii gtt. II.

Medull. bovin.

Lanolin. aa ad 50,0 } вместо этого можно

Resorbin ad 50,0.

M. D. S. Помада для волос.

Уход за кожей: С а в е: рисовой пудры, вследствие кислого разложения.—Ежедневное обмывание в постели коньяком.—Спину и складки принудривать тальком!

Похудевшим и пожилым рекомендуется профилактический цинковый пластырь на крестец, трохантер и т. д.—Резиновый круг.—Водяная подушка (темп. воды 35°).

Нечистая кожа, угри: лизоформенное мыло,—лизоформ (10/0-ный) для обмывания.

Красная, шершавая кожа лица: не носить вуалей!—Не мыть, а обтирать Ol. amygd. dulc. (40,0).—Ночью смазывать ланолином, припудрить.

(Уход за кожей) Кожный зуд: ментоловый спирт или тимоловый спирт (0,25 : 100,0), или ментол-вазелин, или тальк.

Фурункулез

Кровоочистительный чай (Spec. gypaес.) или Карлсбадская соль.

Головные вши: смазывать голову Acet. Sabadillaе, завязать повязкой и оставить в таком виде в течение 24 часов.

Фурункулез 1. Саве: выдавливать, инцизия!  
2. Саве: пластыря. 3. Саве: алкогольных компрессов.

Очистить бензином.

Осторожно сбрить окружающие фурункулы волосы.

Фурункулез: Удалить волосы след. составом: Barii sulfurat. 25,0, Amyl., Zinc. oxyd. aa 50,0 (смешать с водой и намазать на кожу); согревающие компрессы, припарки, всасыватель. Ванна из отрубей.

Во время эпидемии стафилококковых заболеваний кипятить воду для питья и умыванья!

Дрожжи (3 раза в день по 1 чайной ложке, с жидкостью).

Magnesia citrica effervescens: 3 раза в день по чайной ложке на воде после еды.

Подкожные впрыскивания 1—2 раза в неделю стафилококковой вакцины (1 куб. см).

Pityriasis versicolor: обмывать карболовым мылом.—Втирать кусочки Ungt. sulfur. simpl. размером в горошину.



## ГОЛОВНЫЕ БОЛИ.

## Головные боли

Свежий воздух! Устранить запор!

Исследовать органы головы!—Моча!—Прежняя половая жизнь (Coitus interruptus!)—Сколько больная работала.—Каков сон.—Свободное время?

У анемичных на голову термофор. Лежать в горизонтальном положении.

При мигрени: темная комната, покой.

Крепкий кофе ( $1\frac{1}{2}$  чашки).

Pyramidon 0,2—0,3. Антипирин с кофеином 0,5—1,0.

При рвотах:

Rp. Pyramidon 0,25.

Coffein. natriobenz. 0,1.

Butyr. Sac. ad 2,0.

M. f. supp. D. tal. supp. № VI

S. Вводить по 1—2 свечки в прямую кишку.

С а в е: лумбальной анестезии при головных болях.

Головные боли после лумбальной анестезии:

Аспирин или пирамидон по очереди. Термофор, мешок с горячим песком на затылок.

Повторная пункция: 20—30 гр. жидкости.

Не инфицировать рук! С а в е: экзема—излишней антисептики!—Во время приема носить на левой руке перчатку!

Во всех подозрительных случаях производить исследование влагалища и прямой кишки с резиновым пальцем!—Бывший в употреблении—вымыть, пронакипятить и припудрить.

Делай перевязки с помощью инструментов! Не касайся ни до чего!

1. Врач:

Употреблять прокипяченные щетки!—Ногти наполнять мылом!

Мыть руки кипяченой водой (не горячее 42°С.) с мылом: мыть щеткой 10 минут, вычистить ногти (не слишком коротко остриженные).

Оберегайте наружную часть руки и сгибательную часть предплечья!

Влажные кисти рук и предплечье протирать насухо борной кислотой в порошке и ею же наполнять ногти,—или обтирать в течение двух минут мыльным спиртом. (В виде исключения, как напр., в квартире у больного, можно пользоваться и древесным спиртом), затем сполоснуть руки и мыть их щеткой с 1<sup>0</sup>/<sub>0</sub>-ным теплым раствором лизоформа (кипяченая вода) (2—5 минут).

Прокипяченные в течение двух минут резиновые перчатки протереть щетками, наполнив перчатки предварительно раствором борной

кислоты или лизоформа: применяются при родовспоможении, лапаротомиях и септических или подозрительных случаях. (Дезинфекция)

Резиновые перчатки: после употребления вымыть, кипятить в течение двух минут, обсушить, снаружи припудрить! Затем их вывернуть, надуть, обсушить, припудрить!

Сапе: оставлять сушить.

Нитяные перчатки стерилизуются, как перевязочный материал.

Жесткие руки смазать на ночь безводным ланолином или Resorbin'ом и затем надеть нитяные перчатки.

Сулема (1:1000 — 2000) применяется редко, лишь после соприкосновения с больным сифилисом или септическим больным.

## 2. Операционное поле:

Бреется бритвой или очищается от волос специальным порошком.

Обмывание 1%-ным раствором лизоформа или сулемой 0,5:1000,0.

Кожа живота протирается эфиром или спиртом!

Влажная кожа припудривается борной кислотой.

(Дезинфекция) Tinct. jodi (разбавленная наполовину алкоголем) употребляется исключительно только для смазывания узкой полосы предполагаемого разреза, лучше всего смазывать сулемовым алкоголем 1,0 : 1000,0! — Припудрить борной кислотой! — Обложить рану стерильными тампонами.

---

Влагалище промывается 10%-ным раствором лизоформа. — Протирается сулемовым тампоном одновременно с наружной частью половых органов. — Кожа бедра и влагалища после мытья припудривается борной кислотой! — С а в е: настойки иода!

---

Нет пограничных областей между медициной и хирургией, есть только общая область — врачебного искусства  
Эрнст Бергман.

## ЗУД.

Зуд  
(Pruritus)

Зуд половых частей: обратить внимание на  
Soor у беременных и кормящих грудью!

Исследовать мочу! Противодиабетическое питание!

Инсулин!

Исследование на острицу!

Охлаждение водой запретить как вредное! — Не носить закрытых панталон!

При наличии Soor'a протереть влагалище и вход в него сулемовым тампоном (1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>)!

Снотворные средства (трионал 1,0, хлорал 1,0 — 2,0 и т. п.) необходимы! С а в е: антипирина, мигренина! — С а в е: брома! С а в е: морфия!

На дому: один раз в день прохладные обмывания (карболовым или дегтярным мылом), затем цинковая пудра, цинковая мазь, цинковое масло или

Rp. Menthol. 0,3 (—0,75)

Eucain. hydrochlor. 1,0 (—2,0)

Salol.

Ol. olivar. aa 2,0

Lanolin ad 40,0 (50,0)

M. f. ungt. D. S. Для намазывания на ночь.

Или: Lanolin. anhydric. 200,0.

Или: Rp. Anaesthesin 5,0

Resorbin ad 50,0

M. f. ungt. D. S. Для употребления при зуде.

**(Зуд)** Rр. Camph. trit. 0,5 (—1,0)  
**(Pruritus)** Zinc. oxydat. 2,5  
Talc. venet. ad 50,0  
D. S. Для припудривания днем.

Влагалище протирается сулемовым тампоном (1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>).  
Удаление в приемной врача волос с наружных половых органов до заднего прохода,—при помощи бариевого порошка (см. стр. 40). Обмыть прохладной водой, мазь или пудра.—Проложить кусочком марли (не ватой).

Зудящие места смазываются

Rр. Mesotan 10,0  
Ol. Olivar. ad 50,0.

M. D. S. На руки врачу. Смазывать (1—2 раза в неделю) все наружные половые органы. Мазь не смывать в течение 24 часов.

Смазывать 1—5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Argent. nitr. (белье!), затем смыть раствором поваренной соли; или хлороформовым маслом; или смазать палочкой Acid. carbolic. liquef (не делать этого при диабете), затем—мазь.

Жжение во влагалище:

Rр. Anaesthesin. 0,2 (или Eucain. 0,03)  
Acid. boric. 0,5  
Butyr. sac. ad 2,0

M. f. glob. vag.

D. tal. glob. № X

S. 1 (—2) раза в день вводить по одной глобуле во влагалище.

Исследование позвоночника, исследование через прямую кишку!

Исследование на диабет и люэс!

Сидеть на мягких подушках—тепло (мешок с горячим песком).

Впрыскивание: Rp. Antipygin. 2,0

Eucain. hydrochl. 0,06

Aq. destill. ad 100,0

M. D. S. Впрыснуть 50 гр. в область шейки бедра (не в нерв); в случае необходимости—повторить.

При карциломе: впрыскивание морфия.

Не недооценивай болей и не объясняй их только нервностью! Мы их не чувствуем, поэтому не знаем всего.

Не обязательно, чтобы лечение было болезненным!

Слабительные средства.

Слабитель-  
ные сред-  
ства

Диета: фрукты с кожурой—овощи (компот из ревеня, сливовый мус)—винные ягоды—мятный пряник—молочный сахар—мед—пахтанье—малиновая вода (слабительные средства). По возможности отвыкнуть от слабительных лекарств!

По прошествии 4 недель клизма или смена слабительного!

Вечером клизма из  $\frac{1}{2}$ —1 литра теплой воды  $30^{\circ}\text{C}$  (с некоторым добавлением мыла) или  $\frac{1}{4}$  литра масла (Ol. Sesami), в случае необходимости—утром  $\frac{1}{2}$  литра мыльной воды;  
или ромашка (2 стол. ложки: обдать 1 литром горячей воды, пропустить через полотно и дать остыть).

Молочно-сиропная клизма:  
растворить 250—500 гр сиропа в 250—500 гр молока ( $38^{\circ}\text{C}$ ).

Сироп из винных ягод—1—2 стол. ложки.

Крушинная кора 100—200 гр.  
1 стол. ложку на 1 чашку чая.

Species gynaecologicae Martin:

Rp. Corticis Frangulae conc.

Foliorum Sennae conc.

Herbae Millefolii conc.

Rhizomatis graminis conc. aa 25,0

M. D. S. 1 полная стол. ложка на чашку чая.



01. Ricini, 1—2 стол. ложки, с малиновым сиропом, (Кишечник кофе и т. д. за 24 часа до операции, а также на 3-й или 4-й день после родов.

Слабитель-  
ные средства

Ревень или Саграда в табл.

Pulver. Liquirit. comp. („Kurella“), по одной чайной ложке на воде (одновременно и как отхаркивающее).

Paraffin. liquid. (pro uso interno) 100,0 (1 стол. ложка делает стул безболезненным и мягким), то же действие оказывает Magnesia usta (по чайной ложке).

Александрийский стручек: замочить вечером в чашке холодной воды 10—15 стручков, утром слить и выпить.

Карлсбадская соль: принимать натощак по 1 стол. ложке на стакан теплой воды.

Горькая вода:—Баталинский источник, не более трех раз в неделю.

М а с с а ж: С а в с: где имелись заболевания аднексы или червеобразного отростка!

Самомассаж живота деревянным шаром.

Т е р п е н и е! Первое испражнение после лапаротомий даже на 5—6 день тоже еще своевременно!

(Кишечник  
и желудок)

## Кишечные паразиты.

### I. Ленточная глиста:

Кишечные  
паразиты

1. Накануне вечером приятный сельдочный салат (пробное лечение: на следующее утро 1 стол. ложку *Ol. Ricini* или слабительный чай и т. д.).
2. Рано утром:  
Rp. Extract. Filic. mar. 1,0  
D. ad caps. gelat. tal. dos. № VIII—X  
S. Принимать натошак с черным кофе в течение получаса.
3. Спустя  $\frac{1}{2}$  часа:  
Rp. Inf. fol. Sennae 15,0 : 200,0  
Sirup. rub. Idaeii 20,0  
S. Принять сразу половину.
4. Испражняться над ведром, наполненным теплой водой с добавлением небольшого количества молока. Не тянуть выходящую глисту.
5. Вышедшую глисту осторожно вымыть и, положив ее, даже самые маленькие кусочки, в древесный спирт, отнести врачу!
6. Первая пища после этого—чай или бульон с сухарями.

Детям: Катала (2—3,0) со сливовым мусом. Взрослым 8—10,0! Слабительные излишни.

### II. Острица, аскарид:

Сантониин в таблетках (0,025)—принимать по 1 таблетке в 6, 7 и 8 час. утра, в течение трех дней подряд.

Ol. Chenopod. 8—10—15 капель на сахаре или в калесу- (Кишечник  
лах.—Спустя 1 час слабительное. и желудок)

Rp.  $\alpha$ -Naphthol. 0,2

Eucain. hydrochl. 0,02

Butyr. Sac. ad 2,0

M. f. suppos. D. tal. suppr. № IV

S. Вводить по 1 свечке после испражнений.

Rp. Hydrarg. chlor. mit.

Plv. tub. Jalap. aa 0,2

Elaeos. Tanacet. 0,5

M. f. plv. D. tal. dos. № II

S. Первый порошок утром, второй через 3 дня.

— Лечение повторить через 3 месяца.

Кишечные  
паразиты

Чесночная клизма: Отварить 2 луковицы че-  
споку в литре воды.

### В з д у т и е.

Вадутие

Спиртовый компресс (платок) на поперечную ободоч-  
ную кишку.—Газоотводящая трубка.

Тминный чай—ромашковый чай—подогретый № 17  
„Ессенуки“—Карлсбадская соль: 1 чайная ложка  
на 1 стакан воды.

Tinct. carminativa 10,0—20 капель.

Carbon. lign. plv. 20,0

Принимать в облатках, пачинал с  $\frac{1}{5}$  до целой  
чайной ложки.

Впрыскивание глицерина:

1—2 стол. ложки глицерина и

1—2 стол. ложки воды

(впрыснуть в прямую кишку ручной спринцовкой)

(Кишечник  
и желудок)

После операций:

Вздутие

Аускультация кишек! Дуговой свет: 75° в течение  
10 минут.

Высокая клизма (1—1½ литра). 33°Ц.

Лежать на животе. (Атония кишек после операций).

Rp. Physostigmin. salicyl. 0,01

Aq. destill. ad 10,0

M. D. S. На руки врачу.

Впрыскивать по 1,0 = 0,001 Physostigmin'a.

Поносы

Поносы (Diarrhoea).

Диета: Желудковый какао.—Овсяное какао.—Черничное вино.—Горячий чай с красным вином.  
Сухари.—Рис с корицей.—Картофельное пюре.—Овсянка.

Саво: Кожуры.—Волокнистых веществ.—Фруктов.—Слишком много жидкости.

Термофор на живот.—Носить шерстяной биит.

Rp. Bismuth. subsalicyl. 0,5

D. tal. dos. № X.

S. Принимать 2—3 раза в день по 1 порошку в облатках.

Свечи из опия:

Rp. Op. pur. 0,03—0,05

But. Cacao ad 2,0

M. f. suppos.

D. tal. suppos. № VI

S. Вводить по 1—2 свечи в кишку.

Rр. Tannalbin 1,0 (точно так же Tannigen, Tanninal-**(Кишечник**  
buminat). D. tal. dos. № X. **и желудка)**

S. Принимать 2 раза в день по 1 порошку в об-  
латке. **Поносы**

Bolus sterilis. 100,0.

Принимать 3 раза в день на кончике ножа (в об-  
латках или на воде).

### **Рвота.**

**Рвота у бе-**  
**ременных**

**У беременных:**

Первый завтрак в постели.—Есть каждые три часа  
и понемногу (холодные блюда).

Rр. Ser. oxalic. 0,1

Sach. alb. ad 0,5

M. D. tal. plv. № XII.

S. Принимать 3 раза в день перед едой по 1 по-  
рошку.

Natr. brom. 0,3—0,5 (3 раза в день).

Положить в лечебное заведение! Следить за весом!

Предупредить о возможной необходимости промыва-  
ния желудка. Иметь всегда наготове в комнате  
желудочный зонд!

Клизма из раствора поваренной соли ( $\frac{1}{2}$ —1 чайную  
ложку поваренной соли на  $\frac{1}{2}$ —1 литр воды).—Пита-  
тельные клизмы см. ниже.

**После наркоза и операций:**

**Рвота после**  
**наркоза**

Не глотать льда!—Глубоко вдыхать, удержи-  
вать воздух.

**(Кишечник и желудок)** Ни чего не пить в течение 12—24 часов! Полоскать рот.—Увлажнять губы тряпочкой.—Грызть кусочки лимона!  
**Рвота после наркоза**

Каждые  $\frac{1}{4}$  часа пить по ложечке слабого чаю или подогретый Эссендуки № 18.

Принимать очищенную соду на кончике ножа на воде.

Принять 1 каплю Tinct. Jodi на 3 ложках воды.

Rp. Extract. Belladonn. 0,15

Aqu. amygd. amar. 6,0

Aquae destill. ad 10,0

M. D. S. 10—20 капель по указанию.

Sol. Alyrin. (вместо кокаина) (0,1) 10,0

D. S. Принимать по 20 капель на воде.

Лежать на животе.

Первое питье после наркоза: Овсяный отвар (по желатию больной—сладкий или соленый, густой или жидкий, теплый или холодный) или Белковая вода = 1 яичный белок на стакан воды, с добавлением 1 чайной ложки коньяка или лимонного сока или

Чай из ромашки.

**Промывание желудка**

**Промывание желудка:**

2 стол. ложки хлор. натра развести в 5 литрах воды (30°Ц.).—Раствор прикрывается бумагой или клеенкой.—Кто-либо держит руки больной.—Указательным пальцем левой руки прижать нижнюю губу к внутренней стороне зубов и одновременно придавить

язык книзу.—Смочить резиновую кишку глицерином (Кишечник и быстро ввести ее.—Заставить глубоко вдыхать.— и желудок)  
Влить через воронку 300—400 куб. см. раствора.— Промывание  
Поднимать и опускать, пока вытекающая обратно желудка  
жидкость не будет прозрачной.

**Аппетит, желудочные средства.**

**Аппетит,  
желудочные  
средства**

Анчоусы (вымоченные в течение 12 часов).—Селедка (вымоченная в воде или молоке в течение 24 часов).—

Лимоны.—Очищенную соленые огурцы.

Медикаменты по вкусу: горькие или кислые.

Хинное вино, кондуранговое вино, пепсиновое вино.

Acid. hydrochlor. dil. 10,0

3 раза в день по 10 капель на воде перед едой.

Rp. Pepsin. 5,0

Acid. muriat. dil. 2,0

Tinct. nuc. vomic. 4,0

Aq. qestill. 200,0.

S 3—4 раза в день по столовой ложке.

Rp. Acid. hydrochlor. dil. 2,0

Tinct. Aurantii 3,0

Sirup. simpl. 20,0

Aquae destill. ad 200,0

S. Через 2 часа по столовой ложке.

Rp. Tinct. Chinae comp.

Tinct. Rhei vinosae

Tinct. Zingiberis aa 10,0

M. D. S. 3 раза в день по 30 капель.

Rp. Decoct. Cort. Chinae 10,0 : 170,0

Acid. hydrochloric. dil. 2,0

Sirup. simpl. ad 200,0

(Кишечник и желудок) D. S. По 1 столовой ложке через 2 часа.

Аппетит,  
желудочные  
средства

Rp. Decoct. Cort. Condurango 15,0 : 180,0  
Acid. hydrochloric. dil. 1,0  
Sipur. simpl. ad 200,0

D. S. 3 раза в день по столовой ложке.

При изжоге: жареный миндаль, или  
Natr. bicarbon. на кончике ножа на воде или  
таблетки Magnesia-Perhydrol.

Rp. Aqu. amygd. amar.

Aqu. destill. aa 10,0

D. S. 10 капель в чайной ложке воды.

### П р и м а я к и ш к а :

Геморрой

Геморрой.

Исследовать через ректум. Пациент при этом тужится.

Диета: запрещается: „все твердое“—тяжелый хлеб,  
овощи в кожуре, капуста, волокнистое мясо, костля-  
вая рыба.

Ежедневно стул.—После него прохладные обмы-  
вания.—Мягкая клозетная бумага или вата!—затем  
мазь!

Смазывать

Ungt. haemorrhoidale (Ungt. Hamamelidis) 50,0.

Rp. Bismut. subgallic. 0,3

Cocain. muriat. 0,02

Suprarenin. 0,1



Adip. Lanae  
Vaselin. aa 2,0

(Кишечник  
и желудок)

M. f. suppos. d. tal. dos. № X

Геморрой

S. По 1 свечке утром после испражнений и вечером перед сном.

Как слабительное:

Rp. Fol. Sennae pulv.

Magnesiae ustae.

Sacch. pulv.

Sulf. depur.

Tartari depur. aa 10,0

M. D. S. 3 раза в день по 1 полной чайн. ложке.

Растительные слабительные (см. слабит.).

Fissura ani: ежедневно заботиться о жидком стуле.—

Мази, свечи.— С а в с: палочки ляписа! — Лучшее расширение anus'a или прижигание электрокаутером.

Rp.  $\alpha$ -Naphthol. 0,3

Eucain. hydrochl. 0,03

But. cacao ad 2,0

M. f. suppr. D. tal. suppr. № X

S. Вводить по одной свечке после испражнений (при болезненных катарах).

При ослаблении:

Rp. Extr. Strychn. 0,025

But. Cacao ad 2,0

M. f. suppr. D. tal. suppr. № X

S. Вводить одну свечу после испражнений.

Гантель-пессарий.

**(Кишечник и желудок)** Вливание квасцов: 1 чайная ложка на 200 гр. воды (30°C.). Для промывания при гоноррее прямой кишки.

### Геморрой

**Крахмальные клизмы.** Отварить 2 стол. ложки крахмала в  $\frac{1}{4}$  ложки воды, остудить до 30°C. и прибавить 20 капель Tinct. Opii simpl. (понос, теплы).

### Запоры

### Запоры.

При острых запорах—иметь в виду рак кишек! Исследование через прямую кишку! Удалить окаменелые экскременты!

Рентгеновский снимок только тонких кишек.  
Проктоскоп.

Избегать, по возможности, слабительных, а вместо этого соблюдать диету.—„Перевернутая диета“.—Много жидкостей (черничная вода, кислое молоко).

Слабительные (см. стр. 48) необходимы при опухолях или воспалительных процессах таза

При геморрое саве: касторового масла!

Массаж живота только в тех случаях, когда раньше не было никаких воспалительных процессов (аднекситы, воспаление слепой кишки).

Стул в определенное время (в 8 часов утра и вечером).

Уход за ртом.

(Кишечник  
и желудок

Полоскания для рта.

—  
Уход  
за ртом

Полоскать перекисью водорода (200,0) (1 стол. ложка на стакан тепловатой воды).—Бертолетова соль 20,0 (на кончике ножа на стакан воды).

Язык очищать китовым усом или кусочком лимона.

Смазывать:

Tinct. Myrrh. или Tinct. Ratanhiae 5,0

Glycerin.

Aq. destill. aa 30,0

К этому одна кисточка.

Губная помада.

Зубной врач!

Соог: протирать Natr. biborac. 4,0 : 100,0

(у грудных детей протирать ваткой, намоченной на палочку).

Акушерки и медицинские сестры—незаменимые помощницы врача.

Там, где вичего не паходишь, необходимо быть очень осторожным с выводами, и через некоторый промежуток времени снова повторить исследование.

**Климактерический период**

**КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД.**

Каждое кровотечение подозрительно на рак corpus uteri!

Наблюдение за весом тела в смысле ожирения!

Гимнастика: 1—2 раза в неделю упражнения на свежем воздухе—комнатная гимнастика.

Против приливов и отливов крови:

Magnes. sulfur.

Natr. bicarbon. aa 50,0

D. S. Принимать на кончике ножа на вод. 3 раза в день после еды.

Обмываться лизоформным мылом против пота.

Овариин в таблетках: 3—4 раза в день по 1 таблетке четвертый день пауза.

Бромистые препараты.

Необходимость операции нужно больному доказать, а не уговорить его на нее. Чем категоричнее указание на необходимость операции, тем больше доверия!

Почему пациент недоволен?

## КРОВОТЕЧЕНИЯ.

Кровотече-  
ния

—  
Медикамен-  
ты

Тампонада влагалища (производится и во время менструаций!). 4—6 стерильных, а также припудренных танином ватных тампонов или (50/0!) иодоформенная марля вводятся во влагалище с помощью зеркала и оставляются в нем в течение 24—48 часов!

При анемии—исследовать кровь (гемоглобин и счет красных и белых кровяных шариков!). Картина крови.

Желатина: внутрь,—выписать 100 листков лучшей кухонной желатины и употреблять ежедневно по 8—10 листков попеременно в виде мясного, молочного, фруктового или винного желе.

Rp. Mixt. sulf. acid. 5,0

Syr. simpl. ad 50,0

M. D. S. 3 раза в день по чайной ложке на винном стакане воды.

Rp. Pulv. Secal. cornut. 10,0

D. S. Принимать 3 раза в день на кончике ножа с кофе.

Rp. Infus. Secal. cornut. 8,0 : 180,0

Tinct. Cinnamom. 5,0

Sir. cort. Aurant. ad 200,0. D. S. Каждые 2 часа по столовой ложке.

Rp. Extr. Secal. cornut. fluid.

Tinct. Cinnamom. aa 15,0. D. S. 3 раза в день по 15—20 капель.

**(Кровоте-  
чения)** Rp. Tinct. haemostypt. 40,0 (2,0 = 0,1 Secal. cornut.)  
D. S. 3 раза в день по 20—30 капель.

**Медика-  
менты**

Rp. Extr. Secal. cornut  
Pulv. Secal. cornut. aa 3,0.  
Mass. pil. q. s. (или при запорах  
Pulv. rad. Rhei 1,5).

M. f. pilul. № 60. D. S. 3 раза в день по 1 пил.  
(При миомах принимать 5 раз в течение года).

Rp. Ergotin.  
Glycerin.

Aq. destill. aa 3,0

Sol. Acid. carb. (5%) gtt. II

D. S. Впрыскивать 1—2 гр (при кровотечениях  
после родов, а также как предупреждающее).

Rp. Extract. Secal. cornut. 0,25  
But. Cacao ad 2,0

M. f. suppr. D. tal. suppr. № VI. S. Вводить еже-  
дневно по 1 свечке в прямую кишку.

Secacornin (в ориг. упаковке) (1,0 = 4,0 Secale)  
2—3 раза по 15—20 капель; для впрыскиваний  
1—2 гр.

Rp. Extract. Hydrast. canad. fluid. 50,0

D. S. 3 раза в день по 30—40 капель; принимать,  
начиная со дня назначения до прекращения кро-  
вотечения, и затем начать принимать снова  
за 8 дней до начала менструаций.

Rp. Stypticin in tabl. a 0,05 (в ориг. упаковке)  
2 раза в день по 3—4 таблетки.

Rp. Calcii chlorat. sicc. 1,0  
D. tal. plv. № XII

S. Принимать на воде 3 раза в день по 1 порошку (Кровотечения) в облатках.

Rp. Calcii chlorati crystall. 20,0

Медикаменты

Syr. simpl. 10,0

Aq. destill. ad 200,0

M. D. S. Принимать каждые 2 часа по 1 стол. ложке на молоке.

Rp. Extract. Gossypii fl. 50,0 или

Extract. Hamamel. Virgin. fl. 50,0 или

Extract. Viburn. prunifol. 100,0

D. S. 3 раза в день по чайной ложке.

Все 3 экстракта могут прописываться вместе в дозировке aa ad 100,0.

Rp. Tinct. Opii simpl. 5,0

Extract. Hydrast. canad. fl. ad 25,0

D. S. 3 раза в день по 25 капель  
(при Abortus imminens).

Rp. Acid. tannic. 100,0

D. S. 1 столовая ложка на 1 литр горячей воды (50°C.). Спринцевать 1—2 раза в день. Необходим аппарат с приспособлением для обратного выхода жидкости!

Маточные спринцевания: по возможности избегать! Спринцевания, вырскивания

1 чайная ложка подной настойки на 1/2 литра горячей воды при открытой матке после преждевременных родов (при слабом давлении). (Также Kal. hур., глинозем).

Конституциональные кровотечения:  
Вырскивание Extr. согр. lut. in amp., начиная с 0,7 и не переходя за 1 куб. см (2 раза в неделю).

**(Кровотечения)** Впрыскивание Pituitrina точно так же.

**Сиринцевания, впрыскивания** При непрекращающихся доброкачественных преклимактерических кровотечениях делать, только в хорошо проходимый uterus, ежедневно одно медленное впрыскивание Liq. Ferr. sesquichlorat., разведенного тройным количеством воды; обратное всасывание впрыснутой жидкости  
При появлении колик: зондирование—расширение—последующее прополаскивание через маточный катетер—впрыскивание морфия (0,01).

Желатиновые инъекции: 40,0 желатины растворяют, подогревая в горячей воде—всасывают в большой шприц через длинную каплюлю и впрыскивают через короткую каплюлю по 20,0 в бедро (при склонности к кровотечениям, непрекращающейся menarche и т. д.).

**Желатиновая клизма:**

Растворить 40,0 желатины в  $\frac{1}{4}$  литра теплой воды и добавить 5—10 капель Tinct. Opii.

При кровотечениях у больных карциномой: тампонада сухой „железной“ ватой.

Рентгенотерапия селезенки.

Radium и Mesothorium применять только в больничной обстановке. Не дольше 12 часов.

**Переливание крови**

**Переливание крови.**

**Переливание крови:**

Иметь наготове, как прибавление к крови, Natr. citr. 10,0 : 100,0. Выпустить до 500 куб. см крови,



добавить 250,0 физиологического раствора повар. (Кровотече-  
соли  $t^{\circ} 37^{\circ}\text{C}$ ., пропустить все это через сложенную ния)  
в несколько раз стерильную марлю в стерильную Перелива-  
стеклянную воронку, ирригатор, резиновую кишку ние крови  
и стеклянную трубку.

Кровь жертвующего исследуется таким образом:

1 капля крови жертвующего, 1 капля крови полу-  
чающего с 1 каплей раствора *Natr. citr.* наносится  
на предметное стекло. Кровь свертывающаяся, даю-  
щая хлопья или скатывающаяся под микроскопом  
в кучки—негодна!

Протереть алкоголем сгиб локтя, препарировать вену,  
наложить два кусочка кетгута, перевязать перифе-  
рически, приподнять в центре, промеж вскрыть.  
Перелить. После переливания перевязать в центре  
Зажимы. Марля.

### Бледная немочь, малокровие.

Бледная  
немочь,  
малокровие

Солнечная спальня!—Прогулки.—Гимнастика.—Физи-  
ческие упражнения.

Продолжительный сон—избегать утомительной работы!  
В половой жизни следовать советам врача!

Препараты железа в молоке! Солодовый экстракт.  
Мальцтропон. Овомальтип.

Железистые ванны.

Мышьяковое лечение:

Rp. Sol. arsen. Fowleri 20,0

D. S. 3 раза в день по 3 капли в течение 3 дней,  
затем ежедневно прибавлять по 1 капле, дойдя  
до 9 капель на прием, после чего снова уменьшать

(Кровоте-  
чения)

ежедневно по 1 капле и, дойдя до 3 капель на прием, принимать в день по 3 капли в течение 3 дней.

Зледная не-  
мочь, мало-  
кровие

Вирьскивание мышьяка:

(Natr. kakodylicum в ампулах. Продается в коробках на 1 курс лечения).

Органотерапия:

Oorphogin и Ovarin в табл.

(См. Менструации).

При первом осмотре больной—также и гинекологическом—ей необходимо совершенно раздеться!

На курорте—ни к а к о г о местного гинекологического лечения! Минеральные воды, ванны и диету назначает курортный врач.

С а в с: подолгу и помногу купаться! 3, максимум 4 ванны в неделю!

Молодых матерей с малепькими детьми лучше посылать на море, чем в горы!

С а в с: холодных морских купаний при беременности или склонности к кровотечениям!

Некоторые курорты и источники СССР:

Морские купанья:

Южный берег Крыма—Ялта, Массандра, Ливадия, Алушка, Мисхор, Симеиз, Гурзуф, Алушта, Евпатория, Севастополь.

Черноморское побережье Кавказа: Анапа, Геленджик, Кабардинка, Сочи, Уч-Дере, Гагры, Сухум. Одесса, Аркадия, Люстдорф, Бердянск, Сестрорецк.

Горные станции:

Альпийские: Аббас-Туман, Теберда.

Субальпийские: Кисловодск, Красная Поляна.

Горно-лесные:—Тузлер, Эриклик (обе на южн. берегу Крыма).

Степные кумысолечебные:

Шафрановский кумысолечебный район, Оренбургский, Степной маяк, Красная Поляна, Джанетовка, Боровое, Троицкий кумысолечебный район, Новоузенский.

1) Сведения о курортах и источников СССР внесены переводчиком.

**(Курорты) Бальнео-терапевтические:**

Пятигорск, Ессентуки, Мацеста, Ейск, Псекупск,  
Липецк, Старая Русса.

**Грязевые:**

Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Саки, Май-  
наки (Евпатория), Одесса (Куяльник, Хаджибей),  
Славянск, Тинаки, Эльтон, Карачи (Омской губ.),  
Шира (Елисейской губ.), Малла-Кера (Туркестан).

Для сохранения полной работоспособности необходимо отдых: праздничный и воскресный покой—телесные упражнения, умственное освежение и, по крайней мере, раз в году отпуск с пребыванием за городом. Только это спасает от переутомления и является социальной экономией. Это относится не только к больному, но и к врачу!

И слабый организм должен и может проделывать соответствующие телесные упражнения. Перед обедом—прогулка, после обеда—покой, вечером—дома.

## ЛЕЧЕНИЕ РАН.

Лечени  
ран

С а в е: спиртовых перевязок всех видов!

С а в е: укуснокислого глинозема на пальцах!

Подоформенная марля только 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub>.

Перекись водорода—растворяется в десятикратном количестве воды и применяется для отмачивания повязок!

Vinum camphoratum при грануляциях, салоловая пудра при Psoriasis.

Для обмываний: 1/2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> лизоформ, 2—3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> раствор борной кислоты или 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> раствор глинозема.

Борная кислота в порошке на операционную рану.

Rp. Bismuth. subgall. (Dermatol) или Xeroform.

Acid. boric. aa ad 25,0

M.D.S. Порошок для ран.

При Intertrigo припудривание вазеноловой пудрой.

Пластырь: заменить мастизолом! Размягчение излишне (Лечение ран)

В случаях, требующих наибольшей осторожности, и при повязках на живот и раны употребляется пластырь из окиси цинка.

С а в е: на живот повязки из липкого пластыря, лейкопласта!

С а в е вдвойне: отрывать!

Края ран, куски пластыря обтирать бензином или бензолом, а окружность смазывать цинковой мазью.

Для отвода выделений из брюшной полости, а также при жирных стенках живота и лопастном разрезе применяются стеклянные дренажи на толстых шелковых нитях!

Много дренировать: после каждой лапаротомии, при которой возможны значительные выделения, при каждой большой жирной ране!

Резиновые дренажи только с зажимными булавками.

*Quieta non movere!*

Если у пациента исчезли, наконец, все болезненные явления и его самочувствие хорошо, тогда прекрати всякое, даже местное, лечение!

Материал для наложения швов должен лежать в антисептическом растворе!

Шелк: кипятить в течение часа в 3—5% карболовом растворе, в каковом сохранять и дальше.

Silk worm: кипятить в течение часа в содовом растворе. Сохранять в сулемово-алкогольном растворе 1 : 1000 = раствор II для кэтгута.

И то и другое, по возможности, заменять более дешевыми нитками: нитки наматываются на стеклянную пластинку—кипятятся  $\frac{1}{4}$  часа, сохраняются в 3% карболовом растворе! (С а в е: частого кипячения!).

К о ж а: редкие стежки (Герфовские зажимы).

С а в е: частых и промежуточных швов!

К э т г у т—с у л е м о в ы й к э т г у т—намотанный на стерильные стеклянные катушки кэтгут:

1. В течение 24 часов обезжиривается в эфире.

2. В течение 10 минут обрабатывается в растворе (0,2 : 1000,0) хромовой кислоты.

3. Помещается на 24 часа в раствор I:

Hydrarg. bichlorat. corros. 5,0

Alkohol (75%) ad 500,0

4. В течение 4 недель—в растворе II до употребления:

Hydrarg. bichlorat. corros. 0,5

Glycerin. 50,0

Alkohol (75%) ad 500,0 (раствор сохраняется продолжительное время).

**Материалы** Стерильный кэтгут не следует сохранять сухим, для швов) а помещать его, перенеся стерильным пинцетом в кэтгут-раствор II (см. выше).

Наклеить бумажный ярлычок с указанием даты помещения в раствор. Употреблять не ранее, чем через 4 недели.

Без близкого знакомства с образом жизни и занятиями больного заключение врача будет неполным.



## МЕНСТРУАЦИИ.

## Менструа- ции

Один день беречься! Больным покой!

Мягкие, много раз стиранные бинты (менять утром и вечером).

Обмывать снаружи 2 раза в день! (Пудра, мазь).

По окончании вапна.

С а в с: швейной машины, телесных напряжений, спорта, прохладных ванн! У больных также накануне менструаций.

### Болезненные менструации.

(Dysmenorrhoea).

### Болезнен- ные мен- струации (Dysme- norrhoea)

С а в с: впрыскиваний морфия!

Мятный чай.

Термофор.

Rp. Salipyrin. 0,5 -1,0 (с Codein. phosphor. 0,03)

D. tal. plv. № III

S. Принимать по 1 порошку на глентвейне.

Также антипирин по 0,5—1,0.

Аспирин в таблетках по 0,5 (1—2 раза).

Пирамидон в таблетках по 0,3—0,5 (1—2 раза).

Rp. Eucaini hydrochl. 0,025

или

Extract. Hyoscyami 0,04

Butyr. Sac. ad 2,0

**(Менструации)**

M. f. suppos. D. tal. suppos. № VI

S. Вводить по 1 свечке, смазанной жиром, в прямую кишку (и при слабых болях).

Головные боли см. стр. 41.

**Отсутствующие менструации (Аменорhoea)**

**Отсутствующие менструации.**

**(Аменорhoea).**

При отсутствующих менструациях без беременности  
Pilul. aloët. ferratae № 50

D. S. 2—3 раза в день по пилюле.

80% алкоголь 200 гр. или мыльный спирт 1 стол. ложка на 1 литр теплой воды (40° по Ц.), спринцеваться 2 раза в день.

Зондировать лишь после продолжительного наблюдения!

Внутриматочная фарадизация (1—2 раз в неделю!)

Овариин по 0,5—1,0 (2—3 раза в день).

Пересадка яичников (экстирпированных при случае у здоровых женщин во время операций трубной беременности!)

Действуй уверенно, быстро и с осторожностью!  
(Tuto, cito, jucunde).

Действуй твердо, но деликатно!  
(Fortiter in re, suaviter in modo).

## МОЛОКО.

Молоко



Молоко: при отвращении давать его:

- 1) сырым (если оно надежно!),
- 2) с известковой водой (1 ч. ложка на чашку),
- 3) с коньяком (1 ч. ложка),
- 4) с небольшим количеством чая или кофе.

С а в с: при бактериоурии!

См. также „Роды“.

Мочевой  
пузырь  
и мочевые  
пути

## МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ И МОЧЕВЫЕ ПУТИ.

С а в с: стеклянного катетера!

Упорный цистит требует наблюдения за почками (уретрой)!

Молочная диета—миндальное молоко (Emulsio amygd. dulcium) — шерстяные чулки—термофор—электрическая подушка в шерстяной наволочке (с а в е: ожогов!).

После 7 ч. вечера ничего не пить!

Fol. Uvae ursi 100,0—можжевельниковый чай 100,0  
1 стол. ложку на чашку чаю.

Rp. Urotropin in tabl. à 0,5  
S. Ежедневно по 2—3 таблетки.

Rp. Salol. in tabl. à 0,5  
S. В течение 3 дней, с паузой на 4-й, по 3 таблетки в день; при улучшении—по 2 табл. (до тех пор, пока моча слегка почернеет).

Rp. Extr. Belladonn. 0,1  
Natr. salicyl. 5,0  
Syr. simpl. 10,0  
Aq. destill. ad 100,0  
M. D. S. 3 раза в день по столовой ложке.

Rp. Codein. phosphor. 0,25  
Aspirin 5,0  
Syr. simpl. 10,0  
Aq. destill. ad 150,0  
M. D. S. 2—3 раза в день по столовой ложке (при почечных болях).

Acid. camphoric. 0,5—1,0 Rp.

D. tal. dos. № X

S. Принимать по вечерам по одному порошку в облатках (также против почных потов).

Мочевой  
пузырь и  
мочевые  
пути)

Спринцевания мочевого пузыря (30—32° Ц.) 2—3% раствором борной кислоты;—Sol. Kal. hyp. 10,0 : 100,0 (1—2 чайн. ложки) или глинозем (1 стол. ложка на 1 литр воды). Argent. nitric. 0,5 : 2.000 до 1.000 (вливать не более 200,0!), при жжении прополаскивать после физиологическим раствором поваренной соли.

Катетер (резиновый или металлический) после употребления кипятится, заворачивается в полотняную тряпочку и держится всегда наготове.

С а в е: сохранять в сулеме.

1,0 иодоформглицерина (5%) ввести после продолжительной катетеризации в пустой мочевой пузырь для возбуждения опоражнивающей пузырь мышцы.

Jodoform 10,0

Ol. Sesami 200,0

D. S. впрыснуть 5—10 куб. см (увеличивая ежедневно на 5 куб. см, довести до 40,0).

(Особенно при затруднительном мочеиспускании и туберкулезе).

Sol. Eucain. hydrochlor. 0,2 : 10,0

D. S. 1 куб. см (= 0,02 Eucain.) впрыснуть в пустой мочевой пузырь. (Против болей после мочеиспускания).

Cystitis Trigoni:

В мочеиспускательный канал вводится Tubus вместе с Obturator'ом.—Obturator удаляется.—Ввести ватную палочку, насыщенную 2% раствором Argent.

(Мочевой  
пузырь и  
мочевые  
пути)

nitр.—Tubus вытягивается. Ватная палочка вынимается! (При болях последующее впрыскивание 5 куб. см. физиологического раствора поваренной соли).

Слабость мочевого  
пузыря

### Слабость мочевого пузыря.

Vulva и бедренные складки смазываются ланолином!  
С а в е: простуды!

1. Без фистулы:

Носить полотняные повязки.—Средства от кашля!  
Пить мало в течение дня—вечером больше.  
Плоский пессарий.

При педержании мочи во время сна приподнимать  
нижний конец кровати!

Rp. Extr. Strychni 0,025

Butyr. Cacao ad 2,0

f. suppos. D. tal. suppos. № X

S. Вводить утром 1 свечку в прямую кишку.

2. С фистулой: Urinal.

Пить в течение дня, и ничего не пить  
после 7 час. вечера!

Легкие снотворные!

Salol, Urotropin и т. д.

Цистоско-  
пия

### Цистоскопия.

С а в е: острых катарров.

Пить по возможности больше чая.—Полоскание мочевого пузыря (1—20/0 раствором борной кислоты) 30°—32°Ц. Вливать 200—250 куб. см.

Цистоскоп—протереть мыльным спиртом, а затем вытереть насухо!—Испробовать лампу!

После употребления: сполоснуть и прочистить щеткой с 1% Liqu. formaldehyd. saponat., мыльным спиртом.— Просушить.— После цистоскопирования инфекционных больных цистоскоп оставлять на 24 часа в 20% карболовом растворе.

**(Мочевой  
пузырь и  
мочевые  
пути)**

**Цистоско-  
пия**

**Хромоцистоскопия:** Перед этим не пить!  
1 табл. индигокармина (=Carmin. saccul. 0,08) растворить в колбочке в 20 кб. см Aqu. destill. (=0,4%) и прокипятить; затем впрыснуть 20 кб. см теплого раствора (35°C.) в предварительно хорошо обтертую алкоголем ягодицу. Начало наблюдений через 8—10 минут.

**Уретральные катетеры:** новые! Удалить проволоку.— Завернуть биит.— Чашечка Петри.— Стерилизация в автоклаве.— Закрывать чашечку липким пластырем!— Перед употреблением поставить на лед.

#### **Воспаление почечных лоханок.**

**Воспаление  
почечных  
лоханок**

Согревающие компрессы—мешок с горячим песком.

Чай из бобовых стручков 100,0 (1 стол. ложка : 1 чашку).

Rp. Codein. phosphor. 0,3

Acid. acetyl.-salicyl. 5,0

Syr. simpl. (или Solut. gummos.) ad 150,0

M. D. S. Взболтать! Ежедневно 1—3 стол. ложки (можно в отваре, как полуклизму) при почечных коликах.

**Спринцевания мочевого пузыря** см. выше.  
**Внутренние средства** см. „Мочевой пузырь“.

**Полоскание почечных лоханок:** 2—5 кб. см 20% раствора борной кислоты (спринцевать 2—3 раза в день, выпуская обратно по каплям), или впрыски-

(Мочевой пузырь и мочевые пути) вать с помощью уретрального катетера 2 кб. см Argent. nitr. 0,025:100,0.

**Запах мочи**

**Запах мочи (Coli!).**

С а в е: слишком много молока.—В день максимум 1/2 литра.

Минеральные воды.

Rp. Ol Terebinth. 2,0  
Spirit. rectificat. ad 20,0  
D. S. по 20 капель на сахаре.

Впрыскивание Coli—вакцины.

**Почки**

**Почки.**

Почки: см. также главы Диета, Чай.

Посить круглый год шерстяное белье.—Покой.

С а в е: простуды!

Rp. Liq. Kalii acetici 30,0  
Ol. Petroselini gtt. II  
Aq. destill. ad 200,0  
M. D. S. 3 раза в день по столовой ложке.

Diuretin=Theobromin. hydrobrom. in tabl (1,0! 6,0!)



## ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ОПЕРАЦИИ.

Приготовле-  
ние к опе-  
рации

Накануне.

Больная должна дать согласие на операцию.

(У несовершеннолетних взять согласие родителей или опекунов).

Сердце—мочу исследовать! Обратитъ внимание на остальные органы!

### Борьба с боязнью.

Борьба с  
боязнью

Вечером накануне операции:

Rp. Codein. phosphor. 0,03

Bismut. subnitr. 0,5

D. tal. dos. № VI

D. S. Принять вечером 2 порошка; или  
1—2 таблетки адалина.

Утром перед операцией:

Rp. Morphin. hydrochl. 0,2

Homatropin. hydrobrom. 0,002

Aqu. destill. ad 10,0

M. D. S. За час до операции впрыснуть 1 кб. см (для предохранения от большого слюноточения при эфире); или ампула пантопона (0,02).

Предварительный наркоз морфием-скополамином.

С а в е: при миокардите.

Rp. Morph. muriat. 0,1

Scopolam. hydrobrom. 0,003

Aq. destill. ad 10,0.

D. S. для впрыскиваний (только свежий раствор).

1 шприц à 1,0 за 2 часа до операции,

2-й шприц в той же дозе à 1,0 за час до операции,  
таким образом всего: 0,02 Morph. и 0,0006 Scopol.

(Наркоз,  
операция)

Наркоз, анестезия.

Тишина!

Наркоз,  
анестезия

Н а р к о т и з и р у ю щ и й:

не обращает внимания на операцию,  
следит за каждым дыханием,  
следит за каждым ударом пульса,  
замечает каждое изменение цвета кожи,  
не ощупывает роговицы, но следит за зрачком!  
немедленно сообщает об изменениях!

Р e g i s u l u m m a x i m u m: не реагирующий, расши-  
ренный зрачок!

Убрать маску! Открыть окна! Вытянуть вперед ниж-  
нюю челюсть! Захватить язык щипцами, вытянуть  
его в сторону и придерживать его! Искусственное  
дыхание—кислород—впрыскивать камфору!

П о л о ж е н и е в о в р е м я н а р к о з а:

Рубашку подвернуть за затылок, спереди под руки.  
Руки завернуть! (правая остается свободной).  
Подушки под колени!  
Подушку под крестец!  
Голова лежит всегда на стороне!

С а в е: прижимать руку к краю стола,  
загибать руку за голову,  
сильно отводить согнутую ногу,  
придавливать колени к ногодержателю!

Для непродолжительных наркозов и неболь-  
ших хирургических вмешательств: Chloroethyl (рас-  
пылить на маску).—При возбуждении прекратить!  
С а в е: у детей.

Хлороформ и эфир сохранять в шкафу со льдом.— (Наркоз, операция)  
Лицо смазать вазелином!

С а в е: лить!

Пользоваться только капельницей или Брауновским аппаратом для выдувания хлороформа и эфира!

Иметь всегда наготове баллон с кислородом.

### **Люмбальная анестезия.**

**Люмбальная  
анестезия**

Для инъекций в позвоночник: 2-граммовая ампула с новокаином 0,1, супраренина. 0,00083 в растворе поваренной соли.—Стерильный шприц, прополоснуть!—Кожу на спине обтереть ваткой с эфиром.

Выпустить немного жидкости. Аспирировать и впрыснуть.

Место укола заклеить цинковым пластырем.

Согнуть голову с помощью головодержателя или подушки! Медленно придать высокое положение ягодице (на 5 минут), не более 10°. Металлический под'емник с указателем на столе.

После операции: пребывание в постели с высокоположенной головой!

### **Сакральная анестезия.**

**Сакральная  
анестезия**

Положить большую так, чтобы она тазовой костью была обращена к оперирующему.

Согнуа должны ясно прощупываться!—Боковое положение! — Длинная игла. Пробный шприц со

**(Наркоз,  
операция)**

стерильным раствором поваренной соли. — Игла  
остается торчать.

**Сакральная  
анестезия**

С а в е: если при вкалывании шприца показывается  
кровь от сакрального метода необходимо обяза-  
тельно отказаться!

Наполнение шприца:

5 табл. новокаина „D“ (à 0,2) = 1,0 опускаются в рас-  
крытую ампулу I, затем к ампуле I добавляется  
содержимое ампулы II, растворяется и кипятится.

Ампула I: *Natr. chlor. puriss.* 0,3

*Natr. bicarb. puriss.* 0,25

*Aq. destill. ad* 75,0

*D. tal. dos. № IV* в стерильной ампуле  
для сакрального впрыскивания.

Ампула II: *Sol. Natr. sulfur.* (0,5) 5,0

*D. tal. dos. № IV* в ампулах.

В этот кипящий раствор добавляется 0,3 кб. см из  
ампулы (0,5) *Sol. Suprarenin. hydrochlor.* (Höchst)  
(1<sup>0</sup>/<sub>00</sub>)—дать остыть.

Этого раствора впрыскивается медленно 3×20 кб. см. =  
= 60 кб. см. — Операция начинается немедленно  
после впрыскивания!

**Местная  
анестезия**

**Местная анестезия.**

Местная анестезия (по Брауну). О местах  
укола прочесть в соответствующем руководстве!

1 таблетку „A“ (Höchster Farbwerke) = новокаина  
0,125, супраренина борного 0,000125, растворить в  
2—5 кб. см. окисленного раствора поваренной соли

*Natr. chloratum* 9,0

*Acid. hydrochlor. dil. gtt.*—III

*Aqu. destill. ad* 1000,0

в стерильной пробирке или 5-граммовой ампуле. (Наркоз, операция)  
Дополнить 0,9% стерильным раствором поваренной соли (без добавления соляной кислоты) до 25 куб. см. Местная анестезия  
(= 0,125 новокаина: 25 куб. см. или  $\frac{1}{2}\%$ ); по мере надобности берут

2 таблетки = на 50 гр. жидкости  
или 4 таблетки = на 100 гр. жидкости.

$\frac{1}{2}\%$  раствора может быть вприснуто в ткань до 200 гр. = 1,0 новокаина. Употреблять всегда свежий раствор.

Для стерилизации шприца и пробирки разрешается употреблять только стерильный раствор поваренной соли. Сода разрушает новокаин.

### Исследование под наркозом.

Исследование под наркозом

С а в с: наркозов в небольшой обстановке

Приготовление к исследованию и лечению под наркозом (в амбулатории).

Предварительно пациентка получает следующие указания:

1. Исследование и лечение под наркозом производится только в случае самой крайней необходимости.
2. На кануне дня исследования необходимо опорожнить желудок с помощью слабительных чаев или Карлсбадской соли (50,0) 1 ст. ложка на стакан горячей воды, или клизмы (вечером  $\frac{1}{2}$ —1 литра тепловатой воды).
3. Если возможно, принять теплую ванну, во всяком случае обязательно вымыться основательно с мылом.
4. В день исследования нельзя есть; рано утром разрешается выпить чашку черного

**(Наркоз,  
операция)**

**Исследова-  
ние под  
наркозом**

- кофе. За 4 часа до исследования нельзя больше абсолютно ни есть, ни пить.
5. Зубные протезы необходимо оста- влять дома.
  6. В назначенный день к указанному часу пациентка должна явиться. В определенное время за нею должен приехать кто-либо из взро- слых близких ей людей (муж, родственники, со- седи), которым при желании может быть сообщен результат исследования.
  7. В день исследования рекомендуется лежать в по- стели; все работы, если нет никаких спе- циальных указаний врача, можно уже начинать производить со следующего дня.
  8. В течение 4 часов после исследования нельзя абсолютно ничего есть и пить, да же воды! Только вечером, если не было совершенно рвоты, раз- решается выпить немного кофе или чаю, но не из чашки, а ложечкой.
  9. Домой возвращаться на извозчике или автомоби- ле. Пользоваться для этого трамваем или идти пеш- ком не разрешается.

**Наркоз и  
выскабли-  
вание**

**Наркоз и выскабливание.**

При лечении в амбулатории кровоте- чений, не терпящего отлагательства выскабливания, опорожнения матки под наркозом,—больная получает следующие указания:

**Специальные правила поведения.**

1. Отправиться домой в заранее нанятом извозчике или автомобиле. Пользоваться для этого трамваем или идти пешком запрещается.

2. Оставаться в постели в течение 5 дней, встать на шестой день, а на седьмой или восьмой снова показаться врачу. **(Наркоз, операция)**
3. В первый день употреблять жидкую пищу, на второй—легкую, на третий—слабительное (Карлсбадская соль, Баталинская вода, клизма), а затем уже обычную пищу. **Наркоз и выскабливание**
4. Утром, в обед и в 6 ч. вечера принимать предписанные капли (препараты спорыньи).
5. В случае повышения температуры, сильных кровотечений или каких-либо особых осложнений—немедленно обратиться за помощью к врачу.
6. Появление незначительных кусочков или выделений (слизистых или слегка окрашенных кровью) не представляет никакой опасности.
7. Похожие на кожу или мясо кусочки необходимо сохранить в древесном спирте и показать врачу.
8. Вставленный тампон из марли удаляется потягиванием за висящий конец на следующий день вечером. Если вложен пессарий, то он оставляется.
9. Спринцеваний не делать, лишь сполоснуть утром и вечером (кипяченой водой или по специальному указанию врача).

Лучшее лечебное средство—это сон.

## Нервность

## НЕРВНОСТЬ.

Исследовать щитовидную железу!

(Заботы семейные, хозяйственные, половой жизни, служебные!)

Точно регулировать образ жизни: дать расписание всего дня.

Прохладные обмывания! Гулять по утрам! Солнце Сон! Рано ложиться спать. Воздуш. ванны. Прогулки!

Производить только самые необходимые операции!  
С а в с: неправильных диагнозов у нервных!

Припадок истерии:

Опрыснуть холодной водой.—Похлопывать по груди мокрым полотенцем. Холодные обертывания.

Rp. Acid. phosphor. dilut. 5,0

Syr. Rub. Idaeii ad 50,0 M. D. S. 1 чайная ложка на стакан воды.

Rp. Tinct. As. foetid.

Aether. acetic. aa 5,0

Aqu. Menthae piper. ad 30,0

M. D. S. 2—3 раза в день по 30 капель.

Бромистые препараты; таблетки Sedobrol'a.

Rp. Folior. Trifolii fibrini conc. 40,0

Folior. Menthae piperit. conc.

Radicis Valerianae conc. aa 30,0

M. D. S. 1 полная стол. ложка на чашку чая.

См также Болеутоляющие и успокаивающие средства.



## ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА.

Обезболи-  
вающие  
средства

Tinct. Valerianae aeth. 30,0

По 20—25 кап.

Седоброль в таблетках, шипучая бромистая соль.

Rp. Extract. Belladonnae 0,02—0,03

Butyr. Cacao ad 2,0

M. f. supp. D. tal. supp. № VI

S. 1—2 раза в день по одной свечке.

Rp. Codein. phosphor. 0,1 (—0,3)

Aq. Amygd. amar., Aq. destill. aa ad 10,0

M. D. S. По 20 капель по указанию.

Rp. Opii pur. 0,05 (—0,1)

Butyr. Cacao ad 2,0

M. f. supp. D. tal. supp. № VI

S. 2 раза в день по 1 свечке (при угрожающем аборте).

Rp. Morph. hydrochlor. 0,2

Aq. destill. ad 10,0

M. D. S. На руки врачу для впрыскиваний (1 шприц = 0,02); или в ампулах.

Rp. Morph. hydrochlor. 0,1—0,2

Coffein. hydrochlor. 2,0

Aq. destill. 10,0

(Обезболи-  
вающие  
средства)

M. D. S. На руки врачу (при слабой сердечно  
деятельности оперируемой).

—  
Pantopon (1 гр. чистого = 5 гр. опия)

Оригинальный раствор (= 2<sup>0</sup>/<sub>0</sub> пантопона)

10—20 капель или в ампулах по 0,02 для впрыски-  
ваний.

Heroin (действует в 6—10 раз сильнее, чем морфий)  
pro dosi—0,005. Pro die—0,015.

Sol. Heroin. hydrochlor. (0,03—0,05): 10,0 для впры-  
скиваний.

Чулочные подвязки прикреплять на внешней стороне бедра к поясу! С а в е: круглых подвязок.

Шерстяное белье.

Бюстгалтер.

Корсет: при ослабевшем крестце и отвислом жирном животе абсолютно необходим! С а в е: стальных костей, вместо них китовый ус.

Бинт на живот только по мерке! Носить поверх рубашки. Эластическая повязка из крета. Загрязненные не вываривать. В свернутом виде вымочить и выжать в мыльной воде, развернуть и развесить.

Ботинки на шнурках!

С а в е: подмышников.

Половину своей жизни человек проводит в спальне, и поэтому она должна быть на солнечной стороне.

Спроси о квартире. Заботься, чтобы твои больные жили разумно!

## ОЖИРЕНИЕ.

Ожирение — за редкими исключениями — результат употребления большого количества пищи, напитков и сидячего образа жизни!

Исследуйте сердце и мочу!

Голодные годы! Многие страдавшие нарушенным обменом веществ в эти годы выздоровели.

Умеренность в пище, хорошо прожевывать!  
Не голодать, не испытывать жажды!

Строгий курс лечения лишь под врачебным наблюдением! Только в течение шести дней! В воскресенье отдыхать, диета по желанию.

Не запрещать употребления жидкостей страдающим каменной болезнью и подагрой!

### Комбинация „курсов лечения“.

Маленькие порции — принимать пищу 3 раза в день. —

Избегать очень жирных кушаний (масла, сала, растительных масел, соусов, ветчинного, гусиного, утиного сала, лосося, сардинок).

Масло заменить фруктовым пюре и мармеладами.

Избегать очень сладких кушаний (сахара, шоколада, пирожных, засахаренных фруктов, мороженого), вместо этого есть много фруктов, кисловатых компотов, кислого молока, молочного сахара. — Сахарин. — Избегать пряностей, за исключением лимона!

Умеренно: потреблять мучные кушанья, хлеб, картофель.

3 раза в неделю натошак стакан горькой воды!

2 раза в неделю мытье в русской бане (Саве: сердечной слабости), или вместо этого, ежедневно принимать горячую ручную или ножную ванны (по очереди).

По утрам—сыр (в большом количестве). (Ожирение, лечение его)  
1—2 дня в неделю постных: рыба или вегетарианская пища вместо мяса.

Нежирные супы: бульон, фруктовый суп, чай с небольшим количеством молока.

Нежирные кушанья: молодые овощи, салаты, нежирная ветчина, холодное и нежирное мясо, нежирная рыба.

Молочная диета: только во время пребывания в кровати ( $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  литра в 5 приемов), 1 раз в неделю.

Пить только после еды! Запретить алкоголь! Ежедневно 3 лимона.

Ежедневные прогулки течение 2-х часов.

Оварин (препарат из яичников) в таблетках (3 раза в день).

Тиреоидин: в исключительных случаях. Наблюдайте за пульсом!

Не уклоняйтесь от консультаций.

С а в е: пессариев из мягкого каучука.

### П р а в и л а   д л я   ж е н щ и н ,   н о с я щ и х   п е с с а р и й .

1. Пациентка должна каждые 4 недели, обыкновенно по окончании менструаций, являться к врачу, чтобы очистить пессарий.
2. Пациентка должна немедленно явиться к врачу:
  - а) если пессарий давит,
  - б) если мочеиспускание или испражнения затруднены,
  - в) если выделения становятся более обильными или кровянистыми, или более сильно пахнущими,
  - г) если пессарий выскочил.
3. Если пессарий был вставлен во время беременности или же под наркозом, то пациентка на следующий день после этого должна показаться врачу. — Спринцевания разрешается делать только по указаниям врача.
4. Пессарий должен быть вынут и снова вставлен только одним и тем же врачом.
5. Если нет каких-либо особых указаний, пациентка должна ежедневно 1—2 раза производить спринцевания влагалища тепловатой кипяченой водой.

Эти спринцевания могут производиться и во время менструаций.
6. Следует избегать тяжелой работы, поднятия корзин, продолжительного пребывания на ногах и непрерывной работы на швейной машине.
7. Мочеиспускание должно производиться каждые 2 часа. Необходимо заботиться, чтобы, по крайней мере, 1 раз в день был стул.

- Рекомендуется утром и вечером полежать в тече- (Пессарии).  
ние  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа на животе.
9. Если родившая больная прежде носила пессарий, то немедленно после того, как она встанет, она должна показаться врачу, чтобы избежать дальнейшего существования загиба матки.
10. При обыкновенном загибе пессарий необходимо носить, по меньшей мере, в течение года.

Воспитывай твоих больных так, чтобы они не говорили о своих болезнях. „Считаться здоровым“—это уже быть „наполовину здоровым“!

Продолжительный сон!—Спать после обеда!

Принимать пищу 5 раз в день; первый завтрак в постели!—Утром овсянка.

Много жира, много сладкого! Пирожные, мучные кушанья! 2 раза в день супы! Ежедневно 1 литр молока в 4 приема. Последний стакан перед сном! Или  $\frac{1}{4}$  литра сливок.

Пить во время еды!

До-и послеобеденное движение на воздухе!

За ужином стакан пива!

Питательные препараты только на молоке,—мясной экстракт и т. д.

Не употребляйте у постели больного иностранных слов и не называйте никаких органов! Больной зачастую больше страдает от названия болезни, чем от самой болезни.

Самое скверное для пациента это сомнение, поэтому делай определенные заключения. Сомнительные данные—также и микроскопического характера—необходимо истолковывать в благоприятном для пациента смысле.



## ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА.

Повышен-  
ная темпе-  
ратура

Холодные примочки или мешок со льдом на голову.

Rr. Acid. citric. 4,0

Aqu. destill. 190,0.

Natr. carb. pur. 9,0.

M. D. S. По столовой ложке каждые 2 часа; или вода с лимонным соком каждые 2 часа.

Снотворные средства. Впрыскивание морфия.

Жаропонижающие средства, при температуре в  $39^{\circ}$  — уже с утра!

Принести облегчение больному важнее, чем не иметь искусственно пониженную кривую!

Пирамидон в таблетках.

1—2 таблетки Acid. acetyl-salicyl.

Rr. Chinin. sulfur. 0,3—05

Butyr. cacao ad 2,0

f. suppos. D. tal. suppos. № X

S. Ввести 1—2 свечи в кишку.

„Напиток для септических больных“: ежедневно по 1 стакану; состоит из  $\frac{1}{3}$  коньяка,  $\frac{2}{3}$  воды, 2 яичных желтков и сахара (добавить на кончике ножа корицы).

При приближающемся ознобе: бутылки с горячей водой (обязательно завернутые в шерстяную ткань). Двойные одеяла. Глинтвэйн, горячий чай с коньяком, кофе с ликером и аспирином (1,0) или свечи с хинином, как указано выше.

**(Повышенная температура)** Вообще же избегать алкоголя у непривычных к нему, или же при послеродовой горячке! Алкоголь только при температуре ниже нормальной, ознобе, сильной слабости и перед вставанием с кровати — но в небольших дозах! — **С а в е:** при температуре у больных пизелитом!

**П о с л е о п е р а ц и й:** осмотреть рану. Удалить швы, — при опухолях влажная повязка (1 стол. ложка перекиси водорода на  $\frac{1}{2}$  литра кипяченой воды).

Collargol (5—10 кб. см.) в локтевую вену левой руки  
Через 3 дня повторить.

Поливалентная стрептококковая сыворотка Meyer-Ruppel, в ориг. упаковке (также профилактически): 20—40 гр. **С а в е:** 1) повторных впрыскиваний, вследствие анафилаксии! 2) у пациентов, которым в течение последних лет впрыснута вообще какая-нибудь сыворотка.

Ungt. Credé — ежедневно 2 гр.

Каждый седьмой день свободный. Каждая отдельная часть тела по истечении недели обмывается и не натирается в течение 24 часов!

Шерстяная рубаха — уход за ртом.

**С а в е:** при диаррее.

В т и р а т ь.

- 1 день: живот;
- 2 „ бока и подвздошную область;
- 3 „ правую руку;
- 4 „ левую руку;
- 5 „ правую ягодицу;
- 6 „ левую ягодицу;  
обмывать, начиная с первого;
- 7 „ свободный;

- 8 „ в живот: втереть 2 гр. и обмыть бока и (Повышен-  
подвздошную область; ная темпе-  
9 „ втереть в бока и подвздошную область ратура)  
и обмыть правую руку и т. д.

**Лихорадка с воспалением аднексы.**

**Лихорадка  
с воспали-  
нием ад-  
нексы**

Острое воспаление: Саве: спринцеваний!

Саве: операций при опухолях аднексы в течение первого года, за исключением Дугласова протока.

В течение 2 недель—даже после падения темпера-туры—пребывание в постели.

Лед до тех пор, пока держится температура с болями

Морфий, позже кодеин—суппозитории.

Регулировать стул каждый второй день.

Подострое: Присниц—таблетки Дермазана (по ве-черам во влагалище).

Дуговой свет только после падения температуры.

Врачебное искусство опирается на лабораторию.  
но в то же время должно стоять выше ее.

Записывай каждую жалобу больного; таким обра-зом избежешь его упреков.

**Половая  
сфера**

**ПОЛОВАЯ СФЕРА.**

**Половые сношения (вагинизм.)**

**Половые  
сношения  
(Vaginismus)**

При болях у входа и во влагалище:

Rp. Eucaini hydrochlor. 1,0

Anaesthesin. 5,0

Vaselin. ad 50,0

M. D. S. наружное.

Rp. Eucaini hydrochlor. 0,03

Acid. boric. 0,3

But. Sac. ad 2,0

M. f. globules vagin.

D. tal. glob. № VI

S. Вводить во влагалище по 1 глобуле перед половыми сношениями.

После удаления девственной плевы:

Расширять ежедневно дилтатором, смазанным жиром.

Ободрить.—За полчаса до расширения дать выпить стакан вина с двумя таблетками иогимбина.

**Половая  
чувствитель-  
ность**

**Половая чувствительность.**

1. Отсутствующая: теплые влагалищные спринцевания (40°Ц.) с добавлением 1 ложки 80% винного спирта.

1 стакан вина (с 2 таблетками иогимбина) перед половыми сношениями.

2—3 раза в день (и за 1/4 часа до полового сношения) по 1 таблетке иогимбина.

2. Увеличенная: прохладные обмывания. — Спорт.—Ранний ужин.—Совершенное воздержание от алкоголя.—Запрещение пружинной кровати.

Rp. Glandul. Lupuli.

Extr. Lupuli aa 2,0

Camphor. 0,2

Mass. pil. q. s. ut f. pil. № XX

S. Принимать по 1—2 пилюли с холодной водой.

(Половая  
сфера)

### Бесплодие.

### Бесплодие

Исследование спермы перед каждой операцией против бесплодия.

Презерватив из рыбьего пузыря, обильно смазанный вазелином!

Половое сношение утром.—Презерватив завязать.—Запаковать в вату.—Положить в картонную коробочку.—Отнести в брючном кармане (тепло) в клинику!

Немедленное исследование под сильно увеличивающим микроскопом.

При отрицательном результате повторное исследование!

Даваемые отзывы должны быть очень осторожны.

### Продувание труб.

С а в е: при катарах, кровотечениях, ощущаемых изменениях!

С а в е: производить амбулаторно.

Только у клинически и „пальпационно“ здоровых и отрицательном результате исследования — только после клинической подготовки рано утром — при пустом желудке — аускультация живота (в случае необходимости наркоз).

Аппарат (Зельгейма): кипятить, начиная с кишки с маточным наконечником и шприц.—Ассистент работает шприцем!

(Половая сфера) Шприц наполнить воздухом.  
Portio вставить (пулевые щипцы).—Осторожно ввести маточный наконечник.—Наблюдать за манометром.—Повышать давление сначала до 100 мм Hg, затем до 150 (максимум 200); не более 3 раз 50 воздуха.—Наблюдать за падением манометра, аускультация с помощью фонендоскопа!

Триппер

Триппер.

С а в е: слова „заражение“!

Диета: запрещается алкоголь, все острее—умеренно пить, предпочитать молоко!—Ежедневный ступ!—Запрещается половое сношение.—Никакой физической работы.—Не танцевать!

В острой стадии никаких спринцеваний и мочеиспускательного канала! Покой, особенно во время менструаций. Компрессы из глинозема (1 стол. ложка) или перекиси водорода (2 стол. ложки) на  $\frac{1}{2}$  литра тепловатой воды. Больная должна после каждого соприкосновения с половыми органами, спринцеваний и т. д. мыть руки!

Впрыскивания в мочеиспускательный канал протаргола и 2—5% альбаргина.

Rp. Jodoform. 0,25

Butyr. Cacao ad 2,0

M. f. suppos. D. tal. supp. № X

S. Вводить по вечерам (только в больнице!) по 1 свечке во влагалище.

Rp. Balsam. Copaiv.

Extract. Cubebar. aa 0,6

D. ad. caps. № XL

(Половая  
сфера)

S. 3 раза в день по 1 капсуле во время еды; пауза на четвертый день, или

Санталовое масло или гоносан в капсулах по 0,3, в оригинальной упаковке; 2—3 раза в день по 1 капсуле во время еды в течение 3 дней; на четвертый — пауза.

Rp. Zinc. sulfur. 200,0

D. S. По 1—2 чайн. ложки на 1 литр тепловатой воды для спринцеваний.

Триппер

Маленьким детям:

Саве: высказать подозрение на Stuprum!—Осторожно с вопросами об онанизме!

Окраска гонококков (по Грамму)! Генцианвиолетт—Люголь 2 минуты—1 мин. 95° алкоголь—в течение 2 мин. споласкивать водой—карбол-фуксин. (G. C.—красный).

Rp. Bals. Copaiv. 2,0

Gummi arab. q. s. ut f. emulsio

Sir. simpl. 20,0

Aq. destill. ad 200,0

M. D. S. 3 раза в день по 1 стол. ложке; на четвертый день—пауза.

Обмывание Zinc. sulfur.—(1 чайная ложка на 1 литр), или раствор глинозема (1 ст. ложка на 1 литр).

Ввести 20% раствор протаргола (1 гр.) тонкой маточной спринцовкой во влагалище.

При острых кондиломах:

Острые  
кондиломы

Rp. Summitat. Sabin.

Alum. ust. aa 10,0

D. S. Наружное.

(Половая сфера) Rp. Ungt. Sabinæ 40,0  
D. S. Наружное.

Прижигание хлористым этилом.

Удаление ножницами или кюреткой, последующая примочка 20% раствором ляписа. (С а в е:—у беременных!).

Гонококковая вакцина. Применяется с диагностической целью и при хронических случаях! Наблюдать за местной, очаговой и общей реакцией. Начинать с вырыскиваний 0,2 куб. см. в бедро!

Гоноррея прямой кишки.

Сидячая ванна после жидкого стула.

Спринцевание раствором марганцево-кислого калия 0,25 на 1000,0 или протарголом 0,25 : 250,0.

Свечи:  $\alpha$ -Naphthol. 0,1

Extract. Belladonn. 0,025

Butyr. Cacao ad 2,0

Вводить после спринцевания.

Паховые  
железы

Паховые железы.

О п у х а н и е:

Не бегать.

Примочки

(2 ложки перекиси водорода на 1/2 литра воды.)

Ungt. Kali jodat.

(втирать по горошине).



### Мягкий шанкр.

(Половая  
сфера)

Окраска стрептобацилл метиленовой синькой по Леффлеру!

—  
Мягкий  
шанкр

Реакция на спирохету отрицательна!

Примачивать самым незначительным количеством Acid. carbol. liquef.

Принудривать иодоформом.

Дома обмывания марганцево-кислым калием или перекисью водорода (1—2 стол. ложки на  $\frac{1}{2}$  литра), или сулемой (0,5<sup>0</sup>/<sub>00</sub>).

Позже: иодоформенная мазь или мазь из азотного серебра, или камфорный спирт, или 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub> раствор Sulfurum sulfuricum.

V u b o: постель. Компрессы.

S a v e: радикальной операции.—Только инцизии!

5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> иодоформ-глицерин, или 5<sup>0</sup>/<sub>0</sub> иодоформенное масло.

### Сифилис.

Сифилис

C o n g e n i t a: Calomel 0,01, Sacch. lact. ad 1,0, 2—(3) раза в день по 1 порошку.

Сулемовые ванны (1 гр. на ванну).

Неосальварсан 0,03 в ягодицу:

1 день: 1 ампулу 0,03 неосальварсана растворить

**(Половая сфера)** в 2 кб. см воды, прокипятить; то же самое на 8, 14, 21, 28, 35-й день.

**Сифилис**

На 3 и 5 (10, 12 и т. д.) день впрыскивание сулемы 0,001 (раствор 1 таблетки сулемы 0,5 на 500,0) или

Втирание 0,5 Hg. ciner.

(Первый курс лечения закончен после 6—10 впрыскиваний. Через  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  года повторить.)

**Acquisita:** Осмотр всего тела! Обратиться к специалисту!

**Caue:** табака и алкоголя.

**Уход за ртом и зубами:** Полоскание бертолетовой солью (30,0) на кончике языка на 1 стакан воды.

Регулярно купаться!

**Spirochaeta:** первичную язву или кондилому промыть раствором поваренной соли, высушить, выдавить на предметное стекло. — Добавить поваренной соли. — Исследование в темном поле зрения (масляная иммерсия).

Первичную язву при удобном местоположении вырезать (?), вообще же промыть раствором сулемы ( $\frac{1}{100}$ )—припудрить каломелем. — Ungt. praes. alb.

**Втирание:** втирать 5 раз в неделю (по 2 гр.), 6-ой день ванна, 7-ой день покой.

Красная Нг.-Resorbin'овая мазь.

(Половая  
сфера)

Раз в неделю исследовать мочу.

Сифилис

При поносе, насморке или белке в моче—втирания прервать.

Неосальварсан в ампулах по 0,3—0,45 растворить в 5—7 кб. см Aqua redestill., кипятить.

Иод: при головных болях—невралгии.

Иодистый калий (натрий) — 10,0 : 150,0 (2—3 раза в день по столовой ложке).

Реакция Вассермана: бывает положительной самое раннее через 5 недель после инфекции.

Прокол вены (см. Вены).

Прибор Böttcher'a: реактивная пробирка с канюлей. Выпускают в стерильную реактивную пробирку 6—10 гр. жидкости.

Реакция по Мейнеке.

Для впрыскиваний наиболее удобно растворить 1 таблетку сулемы (0,5 : 50,0) и впрыснуть 1 кб. см этого раствора—0,01. Впрыскивание делать в бедро или верхнюю часть ягодицы. Оставшийся раствор развести до 1 лигра для мытья рук!

Абортивное лечение: в течение первых 5—6 недель.

Растворить ампулу неосальварсана по 0,3—0,4 в 10 кб. см дистиллированной воды, прокипятить.

(Половая  
сфера)  
Сифилис

Через одну неделю второе вливание 0,6, затем каждую неделю по 2 впрыскивания ртути и 1 вливание неосальварсана, или в течение 5 дней ртутные втирания и 1 вливание неосальварсана. Всего 12—14 впрыскиваний Hg. salicyl. и 6 вливаний неосальварсана.

При Lues secund.:

Rp. Hydrarg. salicyl. 1,0

Paraffin. liquid. ad 10,0

S. На руки врачу.

2 сулемовых ин'екции—1 неделе ртутных втираний, затем вливание 0,3 неосальварсана и т. д.

Всего до 12—14 ин'екций Hg. salicyl. и 6 вливаний неосальварсана, затем реакция Вассермана—пауза—проверять каждые 3 месяца.

Вторичный полный курс лечения: через 2—3 месяца;

в первый год 3 курса,

во второй год 2 (—3) курса,

в третий год 1 (—2) курса.

Разрешение вступить в брак может быть дано только спустя 3 года (даже если реакция Вассермана отрицательна). Через 4—5 лет можно вступить в брак даже при положительной реакции Вассермана, но достаточном лечении.

Перенесенная в прошлом супругом гоноррея еще не дает основания для гинекологического диагноза.

## ПОТЕНИЕ.

Потение

### Потогонные:

2—3 чашки горячего чая из липового цвета.—Аспирин в таблетках—два одеяла. Бутылки с горячей водой.—Дуговой свет (75°, 10 мин.).

### Против ночных потов:

После 7 часов вечера ничего больше не пить.

С вечера обмывания с лизоформенным мылом (чайная ложка на  $\frac{1}{2}$  литра прохладной воды).

С а в е: менять рубаху!

Acid. camphor. 1,0—2,0 в облатках.

Rp. Agaricin.

Pulv. Dower. aa 0,5.

Mass. pil. q. s. ut f. pil. № L

S. Принимать вечером по 1—2 пилюли.

История медицины учит, что через 20 лет все будут лечить иначе. Все идет вперед, но новые ростки произрастают из старого корня.

Поэтому не забрасывай старого! Не набрасывайся на новое!

Не будь скептическим по отношению к новому!  
И не придерживайся только старого!

Простуда  
насморк

## ПРОСТУДА, НАСМОРК.

С а в е: паровой бани!

Измерить температуру!

Лицо мыть т е п л о й водой!

Теплое нижнее белье (днем и ночью). При больных верхушках легких—фланелевая жилетка.

Ментоловый порошок против насморка.

1—2 таблетки Acid. acetyl-salicyl.

Потение. (Липовый чай: 2 столовых ложки на  $\frac{1}{2}$  литра воды).—Сменить белье лишь после того, как пот высохнет.

Кто-либо из близких должен точно знать действительное состояние больного.

Лечение только в больнице.

Лечение лучистыми телами (радий, мезоторий) должно, по возможности, замещать собой необходимость производства больших и тяжелых операций. Во всем мире имеется очень незначительное количество этого средства. Необходимо переработать много центнеров руды, чтобы добыть только равное одной капле воды количество радия. Лечебные заведения имеют в своем распоряжении чрезвычайно незначительное количество радия. Приобретение его стоит громадных средств. При потере его, даже при желании заплатить более высокую цену, приобретение радия чрезвычайно затруднено. Поэтому как со стороны персонала, так и со стороны пациентов, необходимы в обращении с радием величайшее внимание и осторожность. Потеря одной трубочки нанесет ущерб бесчисленному количеству больных, так как однажды добытое количество радия, как бы мало оно ни было, работает в течение многих лет и применяется ежедневно для лечения многих серьезных, не поддающихся лечению операциями случаев. Поэтому больная должна придерживаться следующих правил:

1. Пока средство находится у больной, она не должна оставлять комнаты.
2. Все отправления производить в комнате.
3. Не позволять себе никаких манипуляций со средством.
4. При каких бы то ни было изменениях, даже ночью, звонить сестре. Если, например, закрепление средства ослабло, или оно сдвинется, или выпадет, — больная не должна двигаться, а вызывать сестру или врача.

**(Радий, мезоторий)** Средство находится в капсуле. Эта капсула помещена в упаковку, делаемую специально каждый раз для отдельной пациентки, так что соприкосновения не происходит.

Как во время лечения, так и во время перерывов дома необходимо следить за регулярным действием мочевого пузыря и кишечника. О всяких ненормальностях необходимо немедленно сообщить врачу. Чрезвычайно важно, чтобы все последующие исследования, предложенные врачом, производились аккуратно. Даже при совершенном исчезновении следов болезни и абсолютной безболезненности, больное место должно находиться в течение многих лет под наблюдением. О перемене места жительства пациентки должно быть немедленно сообщено в лечебное заведение.

С а в е: сеансов, продолжительностью более 12 часов!

Слово „хронический“ является для больных страшным призраком. Они никогда не должны его слышать!



**Г а р а н т и я б е з о п а с н о с т и !** — Подготовленный персонал! — Ежедневная проверка жесткости трубок.

Во время действия трубки освещаемый (ая) ни в коем случае не должен отходить от нее.

**З а с л о н д л я л и ц а !**

Медный фильтр 0,2—0,5.—Алюминиевый фильтр 3—5 мм.

Фильтр должен быть раз и навсегда неподвижно прикреплен!

Все прикрывать—после 6 сеансов перерыв на 2—3 недели. Не переходить за дозу „эритемы кожи“

**М и о м ы :** точный, всегда проверяемый диагноз!

**П р о т и в о п о к а з а н и я :**

1. Подслизистые—сопровожденные повышением температуры—послеродовые—невъясненные—болезненные опухоли.
2. Склонность к кишечному катару—катару мочевого пузыря!
3. Расстройство желудка.

**Р е г у л я р н о е и с с л е д о в а н и е к р о в и !**

**С н и м к и .**

Накануне слабительное! Вечером суп. Утром при пустом желудке! Если необходимо, клизма.

**М о ч е в о й п у з ы р ь , м о ч е т о ч н и к , п о ч е ч н ы е л о х а н к и :** наполняются умбралем (Jodlithium) в ампулах.

**(Рентген)** Желудок: с'есть в виде супа серно-кислого бария (химически чистого) 100 гр на  $\frac{1}{2}$  литра воды.

Толстая кишка: Citobaгум для толстой кишки серо-белый, без запаха, хорошо растворить в 200 кб. см воды для клизмы (1— $1\frac{1}{2}$  литра).

После спимка водяная клизма.

Лечение рентгеновскими лучами должно, по возможности, заменить собою необходимость производства тяжелых операций.

Во время действия рентгеновских лучей пациентка находится под постоянным наблюдением и охраной. Кроме того, в ее распоряжении в руке находится колокольчик, которым она должна воспользоваться, если полагает, что чувствует себя нехорошо. Ток после этого немедленно выключается.

Все части тела, которые не должны быть подвергнуты действию рентгеновских лучей, должны быть покрыты платем, помимо этого другие части тела еще особо защищаются от действия лучей. В день рентгенизации пациентка должна пользоваться покоем. В дни, свободные от рентгенизации, следует совершать прогулки и принимать ванны с сосновым экстрактом. При нездоровье или каких-либо изменениях в состоянии здоровья следует немедленно обратиться к врачу.

При пользовании рентгеновскими аппаратами предпринимается все, что известно из последних достижений науки, чтобы избежать излишнего действия рентгеновских лучей на тело. Несмотря на это, может случиться, что, например, при чувствительной коже в ней могут произойти изменения. Загар или легкое покраснение появляются на ней так же, как после продолжительного воздействия солнечного света. Если, при более серьезных заболеваниях, время рентгенизации

должно быть продлено, или действие лучей усилено, то при самой лучшей защите и прикрытии тела могут, в виде исключения, произойти так называемые ожоги, не сопровождающиеся вначале болезненными ощущениями. Эти ожоги представляют из себя приподнятую кожу, пузыри и ранки, которые так же, как и послеоперационные раны, требуют продолжительного времени для их излечения. Перед началом рентгенизации пациентка обо всем этом ставится в известность.

akusher-lib.ru

Никогда не критикуй производившегося до тебя лечения! Это делает пациента несчастным!

Каждое сердце необходимо выслушать!—Просвечивание.—На экране очертить жирным карандашом.— У пожилых женщин измерять кровяное давление!

Сердцебиение:

Холодные компрессы.—Мешок со льдом.—Стакая холодной воды.—Валериановый чай.—Валериановые капли.

Прежняя половая жизнь!

Rp. (Tinct. Strophant. 1,0—2,0)

Aq. amygdal. amar. 6,0

Tct. Val. aeth. или Liq. Ammon. anis ad 20,0

M. D. S. 15—20 капель на прием.

При неправильном пульсе без сердечного заболевания обратить внимание, нет ли катара толстых кишек! С а в е: вегетарианской пищи!

При повышенном кровяном давлении кровопускание 200,0 (левый локтевой сгиб).

См. также Возбуждающие средства.

Сердечные препараты: Digalen, Digipurat (в таблетках или ампулах).

Rp. Inf. fol. Digital ex 1,0 : 180,0

Liq. Ammon. anis. 1,0

Sir. Ipecac. 20,0

S. Через час по столовой ложке; или Strophantin. purissim. (0,0005 до 0,001 внутривенно).

Для „плохого“ сердца осторожный наркоз лучше чем „возбуждение без наркоза“.

Написав репетт, ты еще не облегчил страдания больного.

Саве: острых катаров!

Палочку обматывать тонким слоем ваты!

Смазывать 1—2 раза в неделю Плеффайровской палочкой с 10% иодной настойкой.

10—20% хлористый цинк 1 раз в 8—10 дней, также для поливания при потере эпителия.

Liquor Ferr. sesquichlorati (50%) развести в пробирке пополам с водой (при непрекращающихся идиопатических кровотечениях).

Удостоверения какого бы то ни было характера выдавать только по требованию судебных или правительственных органов!

Больше всего учатся на неудачах. Удачи сами собой понятны.

Вечером непродолжительная горячая ножная ванна.—Заткнуть уши ватой с вазелином!

Отвлекать мысли: считать — читать стихи — думать о колышавшейся ржи — повторить мысленно сделанную поездку — „Я буду обязательно спать“.

Обертывания: перед вечером тепловатая влажная простыня, на нее клеенка, а поверх шерстяное одеяло, — полчаса.

Вечером продолжительная ванна,  $\frac{1}{2}$  часа,  $34^{\circ}\text{C}$ .

Валериановый чай (холодный) — стакан пива.

Седоброль в таблетках,  
Bromural (0,5)

Вечером 2 таблетки, а еще лучше, как подготовительное, в течение дня каждые 3 часа, т.е. в 11, 2, 5, 8 ч.!

Adalin, Trional в таблетках по 0,5; принимать по 1—2 таблетки с теплой водой, также и комбинированные. За 2—3 часа до ожидаемого сна.

Chloralhydrat, по 2 гр. на 50 куб. см. овсяного отвара или воды в виде клизмы (см. также Роды).

Rp. Trional 1,0

D. tal. dos. № IV

S. Принимать по 1—2 порошка в  $7-7\frac{1}{2}$  час. вечера на теплой воде.

Veronal (Acid. diaethyl. barbitur.) 0,3—0,5 в таблетках  
С а в е: у возбужденных.

Роженица после двух бессонных ночей должна обязательно что-либо получить. Опасность психоза! (Снотворные)

Suggestivum:

Rp. Natr. chlorat.

Sacch. lact. aa 0,3

D. tal. plv. № VI

S. „Парижский порошок“.

Морфий только:

1. После операции.

2. В случае внезапных болезненных припадков.

3. При болях у неизлечимых (также в соединении со скополамином).

(Dionin=Aethylmorphin, как Morphin. hydrochlor.).

Так как к кодеину (в три раза менее сильнодействующему, чем морфий) не привыкают, то лучше, вместо морфия, по возможности применять Codein. phosphor.

Спринцевания не делать чаще 2 раз в день!  
Кружка (ни в коем случае грушевидная спринцовка!!) на высоте  $\frac{1}{2}$ —1 м над тазом.

С а<sup>5</sup>в<sup>е</sup>: сулемы, карболки, лизола, хлор. цинка, формалина.

См. также Тампонирование.

Слизерастворяющие: сода (в порошке) 200,0  
1 стол. ложку на 1 литр воды или  
Мыльный спирт  
1 стол. ложку на 1 литр тепловатой воды или  
Lysoform (в ориг. упаковке)  
1 чайн. ложку на  $\frac{1}{2}$ —1 литр воды.

Одеколон (1 чайн. ложку) или Spirit. sapon. odoratus  
(1 стол. ложку) на 1 литр воды при остром запахе.

Борная кислота (в кристаллах) 200,0  
1—2 стол. ложки на 1 литр тепловатой воды.

Гливозем в растворе 200,0  
1—2 стол. ложки на 1 литр тепловатой воды.

Квасцы 400,0  
1 стол. ложка на 1 литр тепловатой воды.

Древесный уксус 500,0  
1—2 стол. ложки на 1 литр воды (при потере эпителия).



Rp. Kali permangan. 20,0

Несколько кристаллов на 1 литр воды.

(Спринцевания)

Sol. Kal. hyp. 20,0:200,0. D. S. 1 чайная ложка : 1 литр  
(при изъязвлениях и Decubitus).

Стассфуртская соль (1 кг) или Тамбуканский маточный рассол (1 литр)

2 стол. ложки на 1 литр горячей воды

(при хронич. воспалит. процессах).

Rp. Kalii jodati 5,0

Tinct. Jodi 20,0

Aq. destill. ad 200,0

M. D. S. Наружное. 1 стол. ложка на 1 литр воды.

Rp. Zinc. sulfur. 100,0

D. S. 1—2 чайн. ложки на 1 литр тепловатой воды  
(при гоноррейных белях).

Rp. Cupr. sulfur. pulv. 100,0 (или с Acid. boric. aa)

D. S. На кончике ножа на 1 литр воды

(1 чайн. ложка при гнойном катаре).

Rp. Acid. tannic. 100,0

D. S. 1 стол. ложку на 1 литр горячей или ледяной воды  
(при кровотечениях).

Rp. Infus. Herbar. Conii 20,0 : 230,0

Aq. Amygd. amar. 20,0 или

Tinct. Opii simpl. 10,0

M. D. sub sign. venen. S. 2 столов. ложки на 1 литр тепловатой воды. Впускать медленно! (Болеутоляющее спринцевание).

**Спринцевания** 20 капель Tinct. Opii simpl. (выписать 10,0) на 1 литр тепловатого настоя ромашки (болеутоляющее спринцевание).

2% карболовый раствор (1 стол. ложка) или Creolin или Liq. Cresol. saponat. 100,0. D. sub signo veneni.  
S. 1 чайн. ложку на 1 литр прохладной воды  
(при разлагающейся карциноме).

## КОБЧИКОВАЯ КОСТЬ.

Кобчик

Исследование через rectum! Резиновый круг!

Rp. Veratrin. 0,1

Chloroform. 5,0

Ol. arachides 50,0

M. D. S. Наружное.

Rp. Eucain. hydrochl. 0,02

Pyrazolon. dimethylphenyl. 0,5

Butyr. Sac. ad 2,0

M. f. supp. D. tal. supp. № X

S. Ввести в кишку одну свечку.

Резекция кобчика только при фрактурах и повреждениях.

См. также сакральную анестезию.

С а в е: продолжительного лечения! Не более 10—12 тампонов (6—8 недель).

Тампоны вкладываются врачом 2 раза в неделю и оставляются лежать в течение 24—48 часов.

Rp. Jod. pur. 0,25  
Kal. jodat. 5,0  
Glycerin. ad 100,0  
D. S. Для тампонов.

Rp. Zinc. sulf. (или Acid. boric.) 5,0  
Glycerin. ad 100,0  
D. S. Для тампонов.

Rp. Jodoform 5,0  
Glycerin. ad 100,0  
D. S. Для тампонов (не амбулаторно).

С у х о е л е ч е н и е: иодоформенная марля оставляется в течение 1—2 дней!

1 стол. ложка Acid. boric. pulv., Bolus или Lenicetbolus (20%, стерильный) насыпается через зеркало, затем закладывается сухой тампон.

Ester-Dermasan—шарики: пациентка может сама закладывать их 3 раза в неделю. Вечером вкладывается 1 шарик и на утро выполаскивается теплой водой.

Не высказывай слишком быстро первого впечатления—первого диагноза!

## УКРЕПЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА.

Укрепляющие средства

1 стакан вина.

Растирание камфорной мазью.

Мышьяк:

Rp. Ferri red. 1,8

Acid. arsenicos. 0,03

Piper. nigr. pulv.

Rad. Liq. pulv. aa 0,9

Mucil. Gum. arab. q. s. f. pil. № XXX

D. S. 3 раза в день по 2 пилюли.

Sol. Fowleri (= Liqu. Kalii arsenicos.) 10,0

3 раза в день по 2—9 капель (сначала увеличивая, а потом уменьшая каждые 3 дня на 1 каплю (последней)).

Мышьяк для впрыскиваний: Natr. cacodylic. in ampl. при сильном малокровии.

Железо:

Rp. Tinct. Ferri romat. 10 гр.

D. S. 3 раза в день по 30 капель.

Pilul. Blaudii (3 раза в день по 2 шт.).

Ferrum oxydat. saccharat. solub. 200,0

Принимать 3 раза в день на кончике ножа на молоке.

Liqu. Ferr. album. 300,0

Принимать 3 раза в день по стол. ложке на молоке через полчаса после еды.

Терпение—величайшая добродетель акушера, в особенности в послеродовом периоде!

С а в е: грелок!

Разрешается пользоваться ими пожилым пациентам и оперированным: завернуть в шерстяной мешок—вода до 50°—бутылка не должна быть слишком полной.— С а в е: ожогов.

Шерстяные чулки, двойная подошва, резиновая подошва.

1. Вечером: обмыть ноги теплой водой! Натереть алко-голем, шерстяные чулки.

Утром: холодные обмывания!

Бегать!

или

2. Вечером: надеть выжатые влажные носки, а сверху сухие шерстяные чулки—снять через  $\frac{1}{4}$  часа.

3. В течение дня ходить в чулках, припудренных изнутри горчицей.

Во время операций, родов, исследованиях на гинекологическом стуле—чулок не снимать! (Опасаться пневмонии).

При вопросе больной врачу: „Как бы вы поступили по отношению к вашей матери, жене, сестре“—вполне понятен соответствующий ответ врача, имеющий для нее решающее значение.

Ч а и (заварить и дать

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| настояться):   | Показанию                             |
| Валериановый   | Нервы                                 |
| Медвежья ягода   | Мочевой пузырь                        |
| Бобовые стручки  | Почки                                 |
| Грудной чай (Rad. Alt-<br>heae, Liquirit. и т. д.)                                     | Кашель, простуда                      |
| Ромашка  | Желудок, кишечник                     |
| Кора крушины   | Запоры                                |
| Укроп  | Роженицам                             |
| Сирень   | Потогонное                            |
| Сумочник   | Печень, кишечник                      |
| Тмин   | Вздутие                               |
| Липовый цвет   | Потогонное                            |
| Мята   | Желудок, вздутие                      |
| Александрийский стру-<br>чок (настаивать в тече-<br>ние 12 час. на холод-<br>ной воде) | Слабительное                          |
| Можжевельник   | Мочевой пузырь, почеч-<br>ные лоханки |

Ты должен заставить своих больных сознать непра-  
вильность их образа жизни и изменить его!—Так ве-  
лико должно быть твое нравственное влияние на них.

## ЭМБОЛИЯ ЛЕГКИХ.

Впрыскивание морфия (0,01).

Открыть окна! Вдыхать кислород (делая перерыв после 5 минут).

Мешок со льдом на сердце!—Говорить шопотом.

При отсутствии пульса—камфора, кофеин (см. возбуждающие средства).

Продолжительное постельное пребывание, пока пульс не будет менее 100!

Не напрягаться при опорожнении желудка!

Операцию эмболии по Тренделенбургу изучить предварительно на трупе.—Держать наготове стерильные инструменты!

Разрешить встать лишь при абсолютной безболезненности икр и сгибов бедра, дважды забинтовав предварительно голень.

Совершенно безопасных операций не существует „Гарантировать“ успех честный врач не может, делая даже самую незначительную операцию.

При прогнозе будьте осторожны, употребляя слова „хорошо“ и „плохо“! Никогда не забывайте прибавить „по человеческим расчетам“ или „пока не наступят какие-либо изменения“.



## КОЕ-ЧТО О ДИЭТЕ.

Кое-что  
о диэте

### 1. Самая легкая диета:

**Жидкая:** для температурающих, после полостных операций, а также разрыва промежности III (C a v e: льда, искусственных углекислых вод).

**Напитки:** теплый чай (с сахаром и лимоном), кофе с небольшим количеством молока, какао на воде, апельсиновый сок, безалкогольные фруктовые напитки, вода с двууглекислой содой (по вкусу), ромашковый чай.

**В прохладном виде:** Эссендуки № 20, Ижевская вода, вода с лимоном (без косточек), апельсиновым соком и следами коньяку.

**Супы:** овсяный отвар (сладкий или соленый, жидкий или густой, теплый или холодный—по указанию больного), нежирный мясной бульон, процеженный фруктовый или овощной суп, молочный суп.

**Холодные заливные:** мясные (из цыплят или телятины), фруктовые, молочные и из вина.

**Яйца:** сырые или взбитые.

**Жиры:** только чистое масло (C a v e: сала, жиров и их суррогатов в тесте).

### 2. Каша (пюре):

После желудочных и кишечных операций, при болезненном желудке, желчном пузыре, геморрое, старым людям, изъязвлениях во рту (пользоваться стеклянной трубкой): рисовая молочная каша, манная каша, яичный желток.

Яйца и жиры см. выше.

**Овощи:** свежие, шпинат, морковь, стручки и салат протираются с кипящей водой.

**Картофельное пюре.** Фруктовый мус (яблочный, сливовый, персиковый и абрикосовый).

**Кремы:** шоколадный и кофейный. Кисели.

**Мясные пюре** (хорошо пропущенные через мясорубку): из голубей, цыплят и телятины.

Сухари и поджаренный хлеб.

**3. Полудieta:**

В начале поправления состояния больного, при среднем аппетите и слабом желудке—небольшие порции (С а в е: приуждать есть и перекармливать).

Для возбуждения аппетита: анчоусы (вымоченные в течение 1—2 часов в воде), хорошая селедка (вымоченная в течение 12—24 часов в молоке), икра, устрицы (зимой).

На обед: суп, мясо с овощами, салат, картофель, компоты, теплый или холодный пудинг, кремы, мороженое (С а в е: ванили).

Вечером (за два часа до сна): холодное мясо, овощи, салат. Слегка поджаренные мясные и яичные блюда. Рагу.

**4. Полная диета:**

При хорошем пищеварении, при пиэмии.

Рыба: для лихорадящих, слабых, лежащих в постели больных,—исключительно доставленная живой.

Для всех страдающих обменом веществ—умеренность в еде. В голодные годы многие, благодаря умеренности, выздоровели.

Всем хроническим больным, как только наступит отсутствие аппетита или чувство слабости, допускаются некоторые уступки и изменения диеты.

1. При белке в моче: С а в е: продолжительного лечения молоком, особенно при слабом сердце. Молоко 1—максимум 2 литра, можно в форме молочных супов, каши. Мало соли.

Приправа: лимон.

Стручковый чай. Белое мясо. Рыба.

Содержащие пурины: черное мясо, печенка, почки, мозги (поэтому не давать подагрикам).

2. При сахаре в моче: перед операцией уменьшить количество сахара. Лечение инсулином. Актив-

ные движения мускулов. Установка на углеводы. После операций: при ацетоне, ацетоуксусной кислоте — не слишком строгая диета, по возможности короткое пребывание в постели. Са в е: морфия.

За пре щ а ю т с я: сахар, сладкое, шоколад.

Умеренное количество: картофеля, мучного хлеба (непросеянный хлеб).

Молодые овощи, тушеные в масле. Много коровьего масла, мяса, сыра.

Са х а р и н: выпис. в таблетках, а не в кристаллах.

3. При желчных камнях: пить много теплой воды. Пища — каши и пюре (см. выше). Основная еда по утрам и самая маленькая вечером. Есть понемногу каждые три часа. Заботиться об ежедневном опорожнении желудка.

Сыр: по утрам — золото, в обед — серебро, а вечером — свинец. Са в е: больших количеств пищи, тяжелой пищи (жирного мяса, капусты, волокнистых веществ, сала, майонеза, мороженого, копчений).

4. При язве желудка: рисовый отвар, очень холодное молоко, мясной сок.

5. При подагре, мочевой кислоте: запрещение алкоголя. Са в е: приностей, пищи, содержащей пурин (см. выше).

Вводить в организм достаточное количество жидкости.

Здоровый человек должен с утра заложить „основу“, хорошо позавтракав, и не есть второго завтрака.

Диететические назначения делай обязательно письменно в форме рецепта! особенно у нервных! Тогда только их будут выполнять.

В диете хронических больных должно идти на самые большие уступки!

Борись за жизнь больного до последнего его дыхания.

## ВЫСШИЕ ДОЗЫ ядовитых и сильнодействующих лекарственных препаратов для взрослых.

Согласно Российской Фармакопее 7-го издания 1925 г.,  
с примечаниями по дозировке для детей.

| Наименование лекарственных<br>препаратов       | P r o<br>dosi die |       |
|--|-------------------|-------|
| Acetanilidum (Antifebrin) . . . . .            | 0,5               | 1,5   |
| Acidum arsenicosum . . . . .                   | 0,003             | 0,01  |
| Acidum carbolicum . . . . .                    | 0,1               | 0,3   |
| Acidum diaethylbarbituric. (Veronal) . . . . . | 0,75              | 1,5   |
| Acid. hydrochloratum pur. dil. . . . .         | 0,5               | 4,0   |
| "    nitricum pur. dil. . . . .                | 1,0               | 3,0   |
| "    phosphoricum pur. dil. . . . .            | 1,0               | 3,0   |
| "    sulfuricum . . . . .                      | 1,0               | 3,0   |
| Aethylmorphinum hydrochloricum . . . . .       | 0,03              | 0,1   |
| Amygdalinum . . . . .                          | 0,02              | 0,06  |
| Amylium nitrosum . . . . .                     | 0,2               | —     |
| Antipyrinum . . . . .                          | 2,0               | 6,0   |
| "    salicylicum . . . . .                     | 1,0               | 6,0   |
| Apomorphinum hydrochloricum . . . . .          | 0,01              | 0,05  |
| "    "    подкожно . . . . .                   | 0,005             | —     |
| Aqua Amygdalar. amar . . . . .                 | 2,0               | 6,0   |
| Argentum nitricum . . . . .                    | 0,03              | 0,1   |
| "    "    colloidale (внутривенно) . . . . .   | 0,25              | 0,5   |
| Atropinum sulfuricum . . . . .                 | 0,001             | 0,003 |
| Bismutum salicylicum basicum . . . . .         | 1,0               | 3,0   |
| Cantharis . . . . .                            | 0,03              | 0,1   |
| Chloralum hydratum . . . . .                   | 2,0               | 6,0   |
| Chloroformium . . . . .                        | 0,5               | 1,0   |
| Cocainum hydrochloricum . . . . .              | 0,03              | 0,12  |
| Codeinum . . . . .                             | 0,05              | 0,2   |
| "    phosphoricum . . . . .                    | 0,1               | 0,3   |
| Coffeinum . . . . .                            | 0,5               | 1,5   |
| "    natr.-benzoicum . . . . .                 | 1,0               | 3,0   |
| "    natro-salicylicum . . . . .               | 1,0               | 3,0   |

| Наименование лекарственных<br>препаратов       | P r o<br>dosi die |       |
|--|-------------------|-------|
| Cuprum sulfuricum (как рвотное) . . . . .      | 0,5               | —     |
| Diacethylmorphinum hydrochloricum . . . . .    | 0,005             | 0,015 |
| Diuretinum . . . . .                           | 1,0               | 6,0   |
| Extractum Belladonnae . . . . .                | 0,05              | 0,15  |
| „ Cannabis Indicae . . . . .                   | 0,1               | 0,3   |
| Extractum Filicis maris . . . . .              | 8,0               | 8,0   |
| Extractum Hyoscyami . . . . .                  | 0,06              | 0,3   |
| Extractum Opii . . . . .                       | 0,05              | 0,3   |
| Extractum Secalis cornuti spissum . . . . .    | 0,3               | 1,0   |
| Extractum Secalis cornuti fluidum . . . . .    | 1,0               | 3,0   |
| Extractum Strychni . . . . .                   | 0,03              | 0,1   |
| Folia Belladonnae . . . . .                    | 0,2               | 1,0   |
| Folia Digitalis . . . . .                      | 0,2               | 0,6   |
| Folia Hyoscyami . . . . .                      | 0,4               | 1,2   |
| Folia Stramonii . . . . .                      | 0,2               | 0,6   |
| Hedonalum . . . . .                            | 1,5               | 3,0   |
| Herba Adonidis vernalis . . . . .              | 0,8               | 10,0  |
| Herba Cannabis Indicae . . . . .               | 0,2               | 0,6   |
| Hexamethylentetramin . . . . .                 | 1,0               | 3,0   |
| Homatropinum hydrobromicum . . . . .           | 0,001             | 0,003 |
| Hydrargyrum bichloratum corrosivum . . . . .   | 0,02              | 0,06  |
| Hydrargyrum bijodatatum rubrum . . . . .       | 0,02              | 0,06  |
| Hydrargyrum chloratum mitto . . . . .          | 0,6               | 1,8   |
| Hydrargyrum chloratum vapore paratum . . . . . | 0,6               | 1,8   |
| Hydrargyrum cyanatum . . . . .                 | 0,01              | 0,03  |
| Hydrargyrum oxycyanatum . . . . .              | 0,01              | 0,03  |
| Hydrargyr. oxydatum rubrum . . . . .           | 0,02              | 0,06  |
| Hydrargyrum oxydatum flavum . . . . .          | 0,02              | 0,06  |
| Hydrargyrum salicylicum . . . . .              | 0,02              | 0,06  |
| Infusum Ipecacuanhae concentratum . . . . .    | 2,0               | 4,0   |
| Jodoformium . . . . .                          | 0,2               | 0,6   |
| Jodum . . . . .                                | 0,02              | 0,06  |
| Kreosotum . . . . .                            | 0,5               | 1,5   |
| Liquor Kali arsenicosi . . . . .               | 0,2               | 0,6   |

| Наименование лекарственных<br>препаратов      | P r o  |        |
|---|--------|--------|
|   | dosi   | die    |
| Morphium hydrochloricum . . . . .             | 0,03   | 0,1    |
| Natrium arsenicicum . . . . .                 | 0,003  | 0,01   |
| Natrium kakodylicum . . . . .                 | 0,06   | 0,2    |
| Neosalvarsanum (внутривенно) . . . . .        | 1,2    | —      |
| Nitroglycerinum . . . . .                     | 0,001  | 0,003  |
| Novocainum (подкожно) . . . . .               | 0,3    | —      |
| Oleum Crotonis . . . . .                      | 0,05   | 0,1    |
| Opium . . . . .                               | 0,1    | 0,3    |
| Orthoformium . . . . .                        | 1,0    | 3,0    |
| Paraldehydum . . . . .                        | 5,0    | 10,0   |
| Phenolum purum . . . . .                      | 0,1    | 0,3    |
| Phosphorus . . . . .                          | 0,001  | 0,003  |
| Physostigminum salicylicum . . . . .          | 0,001  | 0,003  |
| Pilocarpinum hydrochloricum . . . . .         | 0,02   | 0,04   |
| Pituitrinum (подкожно) . . . . .              | 1,0    | —      |
| Podophyllum . . . . .                         | 0,1    | 0,3    |
| Pulvis Ipecacuanhae opriatus . . . . .        | 1,0    | 4,0    |
| Pyramidonum . . . . .                         | 0,5    | 1,5    |
| Radix Ipecacuanhae (как рвотное) . . . . .    | 1,0    | 2,0    |
| Resina Jalapae . . . . .                      | 0,15   | 0,5    |
| Santoninum . . . . .                          | 0,1    | 0,3    |
| Scopolaminum hydrobromicum . . . . .          | 0,0005 | 0,0015 |
| Secale cornutum . . . . .                     | 1,0    | 5,0    |
| Semen Strychni . . . . .                      | 0,1    | 0,3    |
| Stibio-Kalium tartaricum . . . . .            | 0,1    | 0,3    |
| Strychninum nitricum . . . . .                | 0,003  | 0,01   |
| Stypticinum . . . . .                         | 0,1    | 0,3    |
| Sulfonalum . . . . .                          | 2,0    | 4,0    |
| Tablettae Nitroglycerini (à 0,0005) . . . . . | 2 шт.  | 6 шт.  |
| Thyreoidinum . . . . .                        | 0,3    | 1,0    |
| Tinctura Aconiti . . . . .                    | 0,5    | 1,5    |
| Tinctura Belladonnae . . . . .                | 0,5    | 1,5    |
| Tinctura Cannabis Indicae . . . . .           | 1,25   | 3,75   |
| Tinctura Cantharidum . . . . .                | 0,2    | 0,6    |

| Наименование лекарственных препаратов     | P r o<br>dosi die |        |
|---|-------------------|--------|
| Tinctura Convallariae majalis . . . . .   | 1,25              | 3,75   |
| Tinctura Digitalis . . . . .              | 1,0               | 3,0    |
| Tinctura Ipecacuanhae . . . . .           | 2,0               | 4,0    |
| Tinctura Jodi . . . . .                   | 0,2               | 0,6    |
| Tinctura Opii crocata . . . . .           | 1,0               | 3,0    |
| Tinctura Opii simplex . . . . .           | 1,0               | 3,0    |
| Tinctura Strophanthi . . . . .            | 0,5               | 1,5    |
| Tinctura Strychni . . . . .               | 1,0               | 3,0    |
| Tinctura Veratri albi . . . . .           | 1,0               | 3,0    |
| Trochisci Santonini (à 0,03) . . . . .    | 3 шт.             | 10 шт. |
| Tuber Aconiti . . . . .                   | 0,1               | 0,3    |
| Veratrinum . . . . .                      | 0,002             | 0,006  |
| Zincum sulfuricum (как рвотное) . . . . . | 1,0               | 1,0    |
| Zincum valerianicum . . . . .             | 0,1               | 0,3    |

Примечание 1. Высшие дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, указанные в списке, рассчитаны для взрослых людей 25-летнего возраста.

Для невозмужавших и для детей высшие дозы уменьшаются, в зависимости от возраста, приблизительно так:  
 для молодых людей 18 лет . . .  $\frac{3}{4}$  дозы для взрослых  
 " " " 14 " . . .  $\frac{1}{2}$  " " "  
 " детей 7 лет . . . . .  $\frac{1}{3}$  " " "  
 " " 6 " . . . . .  $\frac{1}{4}$  " " "  
 " " 4 " . . . . .  $\frac{1}{6}$  " " "  
 " " 2 " . . . . .  $\frac{1}{8}$  " " "  
 " " 1 года . . . . .  $\frac{1}{12}$  " " "  
 " " до 1 года . . .  $\frac{1}{12}$ — $\frac{1}{24}$  " " "

Примечание 2. Высшие дозы уменьшаются до  $\frac{3}{4}$  и  $\frac{1}{2}$  приема взрослых также и для лиц, перешедших 60-летний возраст.

Примечание 3. Если ядовитое или сильнодействующее лекарственное средство прописано в рецепте

в дозе, превышающей указанную в списке, и притом не прописью и без восклицательного знака, то заведующий аптекой, или его замещающий, обязан снести с врачом словесно (можно по телефону) или письменно (в запечатанном конверте), и лишь после получения ответа отпустить прописанное лекарство в соответственной дозировке. В случае же невозможности объясниться с врачом по той или иной причине, заведующий аптекой или его заместитель отпускает прописанное средство в половине той дозы, которая указана в списке, как высшая. \*)

---

\*) Сведения о высших дозах, равно как и все последующие приведены переводчиком,



## ТАБЛИЦА БЕРЕМЕННОСТИ.

Для определения срока беременности нужно из дня наступления последних регул вычесть три месяца и затем прибавить семь дней.

| День наступле-<br>ния последних<br>регул | Время родов  | День наступле-<br>ния последних<br>регул | Время родов    |
|--|--------------|--|----------------|
| Январь..... 1                            | Октябрь... 8 | Июль..... 5                              | Апрель..... 11 |
| "..... 5                                 | "..... 12    | "..... 10                                | "..... 16      |
| "..... 10                                | "..... 17    | "..... 15                                | "..... 21      |
| "..... 15                                | "..... 22    | "..... 20                                | "..... 26      |
| "..... 20                                | "..... 27    | "..... 25                                | М а й..... 1   |
| "..... 25                                | Ноябрь... 1  | "..... 30                                | "..... 7       |
| "..... 30                                | "..... 6     | Август... 1                              | "..... 8       |
| Февраль... 1                             | "..... 8     | "..... 5                                 | "..... 12      |
| "..... 5                                 | "..... 12    | "..... 10                                | "..... 17      |
| "..... 10                                | "..... 17    | "..... 15                                | "..... 22      |
| "..... 15                                | "..... 22    | "..... 20                                | "..... 27      |
| "..... 20                                | "..... 27    | "..... 25                                | Июнь..... 1    |
| "..... 25                                | Декабрь... 2 | "..... 30                                | "..... 7       |
| Март..... 1                              | "..... 6     | Сентябрь.. 1                             | "..... 8       |
| "..... 5                                 | "..... 10    | "..... 5                                 | "..... 12      |
| "..... 10                                | "..... 15    | "..... 10                                | "..... 17      |
| "..... 15                                | "..... 20    | "..... 15                                | "..... 22      |
| "..... 20                                | "..... 25    | "..... 20                                | "..... 27      |
| "..... 25                                | "..... 30    | "..... 25                                | Июль..... 1    |
| "..... 30                                | Январь... 4  | "..... 30                                | "..... 7       |
| Апрель..... 1                            | "..... 6     | Октябрь... 1                             | "..... 8       |
| "..... 5                                 | "..... 10    | "..... 5                                 | "..... 12      |
| "..... 10                                | "..... 15    | "..... 10                                | "..... 17      |
| "..... 15                                | "..... 20    | "..... 15                                | "..... 22      |
| "..... 20                                | "..... 25    | "..... 20                                | "..... 27      |
| "..... 25                                | "..... 30    | "..... 25                                | Август..... 1  |
| "..... 30                                | Февраль... 4 | "..... 30                                | "..... 6       |
| М а й..... 1                             | "..... 5     | Ноябрь... 1                              | "..... 7       |
| "..... 5                                 | "..... 9     | "..... 5                                 | "..... 12      |
| "..... 10                                | "..... 14    | "..... 10                                | "..... 18      |
| "..... 15                                | "..... 19    | "..... 15                                | "..... 22      |
| "..... 20                                | "..... 24    | "..... 20                                | "..... 27      |
| "..... 25                                | Март..... 1  | "..... 25                                | Сентябрь... 1  |
| "..... 30                                | "..... 6     | "..... 30                                | "..... 6       |
| Июнь..... 1                              | "..... 8     | Декабрь... 1                             | "..... 7       |
| "..... 5                                 | "..... 12    | "..... 5                                 | "..... 11      |
| "..... 10                                | "..... 17    | "..... 10                                | "..... 16      |
| "..... 15                                | "..... 22    | "..... 15                                | "..... 22      |
| "..... 20                                | "..... 27    | "..... 20                                | "..... 27      |
| "..... 25                                | Апрель... 1  | "..... 25                                | Октябрь... 1   |
| "..... 30                                | "..... 6     | "..... 30                                | "..... 6       |
| Июль..... 1                              | "..... 7     |  |                |

## НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЕЙШИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ.

Длина плода на

|                       |                    |     |
|-----------------------|--------------------|-----|
| 1 мес. берем. . . . . | $1 \times 1 = 1$   | см. |
| 2 " " . . . . .       | $2 \times 2 = 4$   | "   |
| 3 " " . . . . .       | $3 \times 3 = 9$   | "   |
| 4 " " . . . . .       | $4 \times 4 = 16$  | "   |
| 5 " " . . . . .       | $5 \times 5 = 25$  | "   |
| 6 " " . . . . .       | $6 \times 5 = 30$  | "   |
| 7 " " . . . . .       | $7 \times 5 = 35$  | "   |
| 8 " " . . . . .       | $8 \times 5 = 40$  | "   |
| 9 " " . . . . .       | $9 \times 5 = 45$  | "   |
| 10 " " . . . . .      | $10 \times 5 = 50$ | "   |

Длина пуповины 50 см.

Вес плаценты 500 г.

Околоплодная жидкость 500—1000 г.

Вес зрелого плода около 3200 г.

(Мальчики обыкновенно несколько тяжелее).

Окружность черепа 35 см, плеч 32 см, ягодицы 28 см.

Число биений сердца 116—156.

Окружность живота в конце беременности 100 см.

Таз: Spinae 26 см, Cristae 29 см, Трохантера 32 см,

Conjugata externa 20 см, Conjugata diagonalis

$12\frac{1}{2}$  см, Conjugata vera 11 см.

Длина уретры 26 см.

Содержимое мочевого пузыря 300—400 кб. см.

# ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЕТС. ВОЗРАСТА.

(По проф. В. Молчанову)

| Возраст          | Длина тела | Вес тела | Прибыль веса |        | Окружность |                | Отношение                |                             | Ширина плеч |
|------------------|------------|----------|--------------|--------|------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
|                  |            |          | В месяц      | В день | Головы     | Грудной клетки | Окр. головы к окр. груди | Окр. груди к 1/2 длины тела |             |
| Новорожденный... | 50 см      | 3250 гр  | —            | —      | 34 см      | 32 см          | + 2                      | + 7                         | 13,7 см     |
| 1 день .....     | —          | —        | —            | 100    | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 2 " .....        | —          | —        | —            | 80     | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 3 " .....        | —          | 3000     | —            | 40     | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 4-7 " .....      | —          | 3100     | —            | —      | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 2 неделя...      | —          | 3400     | —            | —      | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 3 " .....        | —          | 3700     | —            | —      | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 4 " .....        | —          | —        | —            | —      | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 1 месяц .....    | 53         | 4000     | 750          | 25     | 37         | 34             | + 3                      | + 7,5                       | —           |
| 2 месяца ..      | 56         | 4700     | 700          | 23     | 39         | 36             | + 3                      | + 8                         | —           |
| 3 " .....        | 58         | 5350     | 650          | 22     | 41         | 38             | + 3                      | + 9                         | —           |
| 4 " .....        | 60         | 5950     | 600          | 20     | 42         | 39             | + 3                      | + 9                         | —           |
| 5 " .....        | 61,5       | 6500     | 650          | 18     | 43         | 40             | + 3                      | + 8                         | —           |
| 6 " .....        | 63         | 7000     | 500          | 17     | 43         | 41             | + 2                      | + 8,5                       | —           |
| 7 " .....        | 64,5       | 7450     | 450          | 15     | 43         | 42             | + 1                      | + 9,5                       | —           |
| 8 " .....        | 66         | 7850     | 400          | 13     | 44         | 43             | + 1                      | + 10                        | —           |
| 9 " .....        | 67         | 8200     | 350          | 12     | 45         | 44             | + 1                      | + 10                        | —           |
| 10 " .....       | 68         | 8500     | 300          | 10     | 45         | 44             | + 1                      | + 10                        | —           |
| 11 " .....       | 69         | 8750     | 250          | 8      | 46         | 44             | + 2                      | + 9,5                       | —           |
| 12 " .....       | 70         | 8950     | 200          | 7      | 46         | 45             | + 1                      | + 10                        | —           |
| 2 года .....     | 80         | 11500    | 200          | 7      | 48         | 47             | + 1                      | + 7                         | —           |
| 3 " .....        | 88         | 12500    | 100          | 3      | 49         | 49             | 0                        | + 5                         | 23          |
| 4 " .....        | 95         | 14000    | 100          | 3      | 50         | 50             | 0                        | + 2,5                       | —           |
| 5 " .....        | 101        | 15000    | 100          | 3      | 50         | 52             | - 2                      | + 1,5                       | —           |
| 6 " .....        | 107        | 16500    | 100          | 3      | 51         | 54             | - 3                      | 0                           | 26,5        |
| 7 " .....        | 113        | 18200    | 150          | 5      | 51         | 56             | - 5                      | 0                           | —           |
| 8 " .....        | 119        | 20000    | 150          | 5      | 51         | 58             | - 7                      | - 1,5                       | —           |
| 9 " .....        | 125        | 22000    | 150          | 5      | 52         | 60             | - 8                      | - 2,5                       | 32          |
| 10 " .....       | 130        | 24500    | 200          | 7      | 52         | 62             | - 10                     | - 3                         | —           |
| 11 " .....       | 135        | 27000    | 200          | 7      | 52         | 64             | - 12                     | - 3,5                       | —           |
| 12 " .....       | 140        | 30000    | 250          | 8      | 52         | 66             | - 14                     | - 4                         | —           |
| 13 " .....       | 145        | 34000    | 300          | 10     | 52         | 68             | - 16                     | - 4,5                       | 36          |
| 14 " .....       | 150        | 38000    | 350          | 12     | —          | —              | —                        | —                           | —           |
| 25 лет.....      | 168        | 66000    | 0            | 0      | 55         | 96             | —                        | —                           | —           |

## Количество материнского молока, высасываемого нормально развивающимся грудным ребенком.

(По проф. В. Молчанову)

| Возраст        | В течение суток |                   | В течение каждого кормления | Суточное число кормлений |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                | Абсолютное      | На 1 кг веса тела |                             |                          |
| 1 день .....   | —               | —                 | —                           | —                        |
| 2 " .....      | до 100 гр.      | —                 | —                           | —                        |
| 3 " .....      | " 200 "         | —                 | —                           | —                        |
| 4-7 " .....    | 240—400         | 100 гр            | 40—50 гр                    | 7                        |
| 2 недели ..... | 500             | 150               | 80—90                       | 7                        |
| 3 " .....      | 550             | 150               | 85—100                      | 7                        |
| 4 " .....      | 600             | 150               |                             | 7                        |
| <hr/>          |                 |                   |                             |                          |
| 2 месяца ..... | 800             | 150               | 120—130                     | 7—6                      |
| 3 " .....      | 850             | 150               | 140                         | 7—6                      |
| 4 " .....      | 900             | 140               | 150                         | 6—5                      |
| 5 " .....      | 980             | 140               | 160                         | 6—5                      |
| 6 " .....      | 1000            | 140               | 160—200                     | 5                        |
| 7 " .....      | —               | 130               | —                           | —                        |
| 8—12 мес. .... | —               | —                 | —                           | 5                        |

### Химический состав:

|                           | Белок | Жир     | Сахар | Соли |
|---------------------------|-------|---------|-------|------|
| Женского молока 0/0 ..... | 1,0   | 4,0     | 7,0   | 0,9  |
| Коровьего " 0/0 .....     | 3,0   | 3,5     | 4,6   | 0,7  |
| Козьего " 0/0 .....       | 4,5   | 4,0     | 4,0   | 0,8  |
| 1 грамм белка дает .....  | 4,1   | калорий |       |      |
| " жира " .....            | 9,2   | "       |       |      |
| " сахара " .....          | 4,1   | "       |       |      |

### Калорийная ценность главнейших видов пищи для ребенка в возрасте до 1 года.

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Женское молоко содержит в 1 литре .....   | 700 | калорий |
| " " центрифугированное .....  | 380 | "       |
| Коровье молоко .....  | 680 | "       |
| " снятое .....  | 410 | "       |
| 1/3 молока + 2/3 воды + 50/0 сахара .....   | 420 | "       |
| 1/2 " + 1/2 " + 50/0 " .....  | 500 | "       |
| 2/3 " + 1/3 " + 50/0 " .....  | 650 | "       |
| 20/0 отвар круп или муки (1 литр воды + 20 гр. крупы или муки овсяной, рисовой и др.) ..... | 580 | "       |
| Сыворотка коровьего молока .....  | 230 | "       |
| Шахтанье без добавлений .....   | 410 | "       |
| " + 40 гр. сахара + 10 гр. муки .....   | 610 | "       |

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Солодовый суп Keller'a .....                          | 800 | калорий |
| Белковое молоко Finkelstein'a .....                   | 50  | "       |
| Ларозановое молоко Stöllzner'a (разб. водою).....     | 425 | "       |
| 1 грамм муки или крупы (овсяной, рисовой и др.) ..... | 4   | "       |

### Прорезывание молочных зубов.

(По проф. В. Молчанову.)

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Период I. | В течение 7—8 месяц. прорезываются 2 нижних средн. резца .....          | (J <sub>1</sub> )= 2 зуб.              |
|           | В течение 8—12 месяц. прорезываются 6 остальн. резцов.....              | (J <sub>1</sub> +J <sub>2</sub> )= 8 " |
|           | В течение 12—16 месяц. прорезываются 4 первые малые коренные зубы ..... | (P <sub>1</sub> )=12 "                 |
|           | В течение 18—20 мес. прорезываются 4 клыка (C)=16 "                     |  |
|           | В течение 22—26 мес. прорезываются 4 вторые малые коренные зубы.....    | (P <sub>2</sub> )=20 "                 |
|           | (Полный состав молочных зубов)  |  |

### Некоторые важнейшие законодательные акты.

#### I. Женщина - обвиняемая.

(Ст. 33 УК, Примечание). В тех случаях, когда перед уголовным судом в качестве обвиняемой предстает беременная женщина, суд не может приговорить ее к высшей мере социальной защиты.

(Ст. 456, п. 2, Уг.-Пр. Код.) ...Если беременность осужденной является препятствием к отбыванию ею наказания, то таковое откладывается до истечения двух месяцев после родов.

#### II. Применение к женщинам мер исправительно-трудового воздействия.

(Ст. 14 Испр.-Тр. Код.). Заключение женского пола помещаются в специально для них предназначенные исправительно-трудовые учреждения.

(Ст. 109 ИТК). При приеме в исправительно-трудовые учреждения заключенных женщин по их желанию принимаются и их грудные дети.

(Ст. 58 ИТК). ...Женщины, начиная с пятого месяца беременности, не подлежат посылке на работы вне места заключения без их на то согласия.

### III. Охрана труда женщин.

(Ст. 131 ТК). Безусловно не допускается ночная и сверхурочная работа беременных и кормящих грудью.

(Ст. 132 ТК). Освобождаются от работы женщины, занятые физическим трудом в течение 8 недель до и 8 недель после родов, а занятые конторским и умственным трудом в течение 6 недель до и 6 недель после родов (ст. 181).

Примечание. Список тех профессий конторского и умственного труда, для которых, вследствие их особенностей, сроки отпуска по материнству устанавливаются в 8 недель до и 8 недель после родов, издается НКТ.

(Ст. 133 ТК). Женщины, начиная с пятого месяца беременности, не подлежат посылке в командировку вне места постоянной работы без их на то согласия.

(Ст. 134 ТК). Для матерей, кормящих грудью, должны быть установлены, помимо общих перерывов (ст. 100 ТК), еще дополнительные перерывы для кормления ребенка. Точные сроки перерывов устанавливаются правилами внутреннего распорядка, при чем перерывы на кормление не могут иметь места реже, чем через  $3\frac{1}{2}$ -часовые промежутки, и продолжительность их должна быть не менее получаса.

Указанные перерывы засчитываются в счет рабочего времени.

После выкидыша, непроизвольного или произведенного врачом в советских учреждениях, лица физического труда по представлении соответствующего удостоверения от врачебно-контрольной комиссии освобождаются от работы на 3 недели, а умственного и конторского труда—на 2 недели. На указанный срок за получившими освобождение от работы сохраняется полностью их содержание как в денежной, так и в натуральной форме. (Изв. ВЦИК 9—XI—1920 г., № 251, Пост. НКТ).

1. Матери, кормящие грудью детей, имеют преимущественное право на работу в предприятиях и учреждениях вблизи места их жительства, чем должны руководствоваться при посылке их на работу местные учрабсилы и комтруды.
2. Матери, кормящие грудью, имеют право перехода на соответствующую работу в другое учреждение или предприятие, отстоящее не далее 2 верст от места их жительства. Перевод их проводится в административном порядке или через местные управления учета и распределения рабочей силы при участии инспекции труда.
3. Местные подотделы материнства и младенчества обязаны в первую очередь предоставлять матерям, кормящим грудью, места в яслях, ближайших к месту их жительства или постоянной работы. (Изв. ВЦИК 11—XI—1920 г., Пост. НКТ и ВЦСПС № 253).

#### IV. О производстве абортов.

(Ст. 140 Уг. Код.). Совершение с согласия матери изгнания плода лицами, не имеющими на это надлежащей медицинской подготовки, или хотя бы и имеющими таковую, но в противосанитарной обстановке,—

лишение свободы или принудительные работы на срок до одного года или штраф до пятисот рублей.

Если эти действия производились в условиях, указанных в первой части статьи, в виде промысла или без согласия матери, или имели последствием ее смерть,—

лишение свободы на срок до пяти лет.

1. Допускается бесплатное производство операции по искусственному прекращению беременности в обстановке советских больниц, где обеспечивается ее максимальная безвредность.
  2. Абсолютно запрещается производство этой операции кому бы то ни было, кроме врача.
  3. Виновные в производстве этой операции акушерка или бабка лишаются права практики и предаются народному суду.
  4. Врач, производящий операцию плодизгнания в порядке практики с корыстной целью, также предается суду. (И з в. ВЦИК от 18 — XI — 1920 г. Пост. НКЗ и НКЮ).
- 
1. Медицинские показания к производству абортов должны быть строго ограничены абсолютной невозможностью матери родить при данном заболевании и в таких случаях аборт производится в первую очередь.
  2. При п/отделах охраны материнства и младенчества в губздравах, а в уездных и фабричных поселках, где нет подотделов—при уездных или фабричных больницах, следует образовать комиссию из врачей и представителей женотделов по разрешению производства абортов в бесплатных советских больницах. (Выписка из цирку. НКЗ от 9 — I — 1924 г. № 13).



- 1) Комиссии по разрешению абортов распределяют койки советских больниц для производства абортов и предоставляют их в первую очередь застрахованным в порядке следующих групп:
  1. Безработные-одиночки, пользующиеся пособием с биржи труда.
  2. Одиночки-работницы, имеющие одного ребенка.
  3. Многодетные—жены рабочих, имеющие трех детей.
  4. Многодетные, занятые в производстве, имеющие трех детей.
  5. Все остальные категории застрахованных.
- 2) Производство операции аборта допускается и в частных, зарегистрированных местными губздравами, лечебницах. (Выписка из цирк. НКЗ и НКЮ от 3/XI 1924 г., № 221).

Наркомздрав разъясняет, что безработность, упомянутая в п. 1 цирк. от 3/XI 1924 г. за № 221 устанавливается документами соответствующего союза.

При распределении комиссиями коек в больницах для производства абортов крестьянки-одиночки и многодетные в смысле очередности приравниваются к женам рабочих. (Цирк. НКЗ от 3/IV 1925 г., № 75).

V. О правах медицинских работников (Ст. 157 УК). Неоказание помощи больному без уважительных причин со стороны лица, обязанного ее оказывать по закону или по специальному правилу,— принудительные работы на срок до одного года или штраф до трехсот рублей.

Отказ лица, занимающегося медицинской практикой, от оказания медицинской помощи, если таковой заведомо мог иметь опасные для больного последствия,—

лишение свободы или принудительные работы на срок до одного года или штраф до одной тысячи рублей.

Выписка из постановления ВЦИК и СИК от 1 декабря 1924 г.

п. 10). Медицинским работникам соответствующих категорий предоставляется право выдавать соответствующие удостоверения в пределах и на основаниях, установленных в ст.ст. 21, 25, 27 и 35 настоящего положения. В удостоверениях, выдаваемых медработникам, должно быть точно обозначено время, место выдачи и цель, для которой данное удостоверение выдано. Удостоверения скрепляются подписью дающего их, с обозначением полного звания и приложением именной печати. В случае отсутствия таковой, подпись должна быть заверена соответствующим учреждением.

**Примечание.** Порядок и условия выдачи удостоверений устанавливаются особой инструкцией Наркомздрава по соглашению с Наркомюстом. Удостоверения этого рода подлежат оплате гербовым сбором в тех случаях, когда таковая оплата предусмотрена уставом о гербовом сборе.

(п. 18). Врачи имеют право производства всех оперативных вмешательств и гипноза, применения наркоза, анестезий, вакцин, сывороток и медицинских средств, разрешенных к употреблению в установленном порядке.

**Примечание.** Применение гипноза разрешается только врачам в соответствующих государственных лечебных и научных учреждениях и в исключительных случаях врачами на дому по специальному письменному разрешению Наркомздрава, на основании особой инструкции

издаваемой Наркомздравом по соглашению с Наркомюстом.

(п. 19). Хирургические операции могут производиться врачами лишь в государственных или существующих на основании надлежащего разрешения частных лечебных заведениях, за исключением случаев скорой и неотложной помощи и простейших операций, согласно особого списка, издаваемого Наркомздравом.

(п. 20). Хирургические операции производятся с согласия больных, а в отношении лиц моложе 16 лет или душевнобольных—с согласия их родителей или опекунов.

**П р и м е ч а н и е.** Операцию, необходимую и неотложную для спасения жизни или важного органа, врач может произвести по консультации с другим врачом без согласия родителей или опекунов, когда они не могут быть опрошены без риска опоздания, и без согласия больного, когда он находится в состоянии бессознательности. Если и консультация связана с риском опоздания, врач может решить вопрос об операции один. О всяком таком случае он должен донести здравотделу не позже 24 часов.

(п. 21). Врачи имеют право выдавать удостоверения или свидетельства о состоянии здоровья пользующего ими больного, а также о рождении и смерти, на основании особой инструкции, упомянутой в ст. 10 настоящего положения.

Выписка из пост. ВЦИК и СНК от 1 декабря 1924 г.—„С. У.“ 1924 г.; № 88.

(п. 7). Всякий медработник, занимающийся частной практикой, должен вести запись больных в особых книгах, прошнурованных и опечатанных здравотде-

дом, обозначая имя и адрес больного, диагноз болезни, а также назначенное лечение. Книги эти медработник обязан представлять по требованиям здравотдела или следственной власти.

Примечание. Размер сумм получаемого вознаграждения заносится, кроме того, в отдельную книгу, прошнурованную и опечатанную органами Наркомфина и пред'являемую по требованию фининспекторов.

